

Aus dem hygienischen Institut der Universität Gießen.

Untersuchungen über die Mikroorganismen des menschlichen Kotes.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde in der Medizin, Chirurgie und Geburtshilfe,
welche

mit Genehmigung der hohen medizinischen Fakultät
der

Vereinigten Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg

Sonnabend, den 11. Januar 1902, 10 Uhr,

öffentlich vortragen wird

Teïsi Matzuschita

aus Kagoshima in Nippon.

Sonder-Abdruck aus dem Archiv für Hygiene Bd. XLI, Heft 3.

(Verlag von R. Oldenbourg in München u. Berlin.)

München 1902.

Druck von R. Oldenbourg.

Untersuchungen

über die

Mikroorganismen des menschlichen Kotes.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde in der Medizin, Chirurgie und Geburtshilfe,
welche

mit Genehmigung der hohen medizinischen Fakultät
der

Vereinigten Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg

Sonnabend, den 11. Januar 1902, 10 Uhr,

öffentlich vortragen wird

Teïsi Matzushita

aus Kagoshima in Nippon.

Sonder-Abdruck aus dem Archiv für Hygiene Bd. XLI, Heft 3.

(Verlag von R. Oldenbourg in München u. Berlin.)

München 1902.

Druck von R. Oldenbourg.

Gedruckt mit Genehmigung
der medizinischen Fakultät der Universität Halle.

Referent: *Prof. Dr. C. Fränkel.*

W. Roux,
d. Z. Dekan.

Seinem Großvater Jheda Matzuschita

und

Frau Aino Hashiguchi

in Liebe und Dankbarkeit gewidmet.

Der Verfasser.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Die Kenntnis von dem Vorkommen kleinster Lebewesen im Stuhl rührt vom Niederländer A. de Leeuwenhoek¹⁾ her, dem Entdecker jener kleinsten Wesen überhaupt. Er hat bereits im Jahre 1675 in seinen diarrhöischen Stühlen mittels einfacher Linsen »Tierchen der verschiedensten Art, welche sich sowohl durch ihre Gestalt und Gröfse, als auch durch die Art ihrer Bewegungen deutlich von einander unterschieden«, nachgewiesen. Lange Zeit war dieses Gebiet in Vergessenheit geraten, bis in den 40er bis 60er Jahren des 19. Jahrhunderts Frerichs²⁾ und andere Autoren auf jene Thatsache hinwiesen, ohne ihr allerdings tiefere Bedeutung beizulegen. Das Vorkommen von Bakterien im Darmkanal gewann erst Interesse vom Momente an, als man nach den bahnbrechenden Arbeiten Pasteurs diese kleinste Lebewesen als Erreger tiefgreifender chemischer Prozesse oder wie bei der Entdeckung des Milzbrandes als Ursache gefährlicher Erkrankungen kennen gelernt hatte. Vom letzteren Gesichtspunkte ausgehend, schenken Hausmann³⁾, Klebs⁴⁾,

1) A. de Leeuwenhoek, citiert nach F. Löffler, Vorlesungen über die geschichtliche Entwicklung der Lehre von den Bakterien. Leipzig, 1887.

2) Frerichs, Wagners Handwörterbuch der Physiologie, 1846, Bd. III, S. 869.

3) Hausmann, Über parasitäre Vibrionen, Berlin, 1870.

4) Klebs, Patholog. Anatomie, 1869, Bd. I, S. 271.

Billroth¹⁾ u. a. (1870—1880) den im normalen Stuhl und Darmkanal vorkommenden Bakterien ihre Aufmerksamkeit. Im Jahre 1886 machte Escherich²⁾ genaue Angaben über die Darmbakterien des Säuglings. Escherich zeigte, daß der Darm des neugeborenen Kindes zunächst bakterienfrei ist, und daß es erst später, allerdings schon innerhalb 24 Stunden, zu einer Invasion der Bakterien kommt. Suchsdorff³⁾ sah, daß die Zahl der Bakterien seiner Fäces, welche er durch tägliche Untersuchung während 24 Tagen ermittelte, an den verschiedenen Tagen sehr bedeutenden Schwankungen unterworfen war (im Maximum 2300000, im Minimum 25000, im Mittel 381000 entwicklungsfähige Keime in 1 mg Fäces). Die Arten und die Zahl der Darmbakterien wechselten je nach der Nahrung sehr. Nuttal und Thierfelder⁴⁾, sowie Schottelius⁵⁾ haben dann nachgewiesen, daß die Darmbakterien für unser Leben geradezu notwendig sind.

Wenn man mikroskopisch die Fäces untersucht, so scheinen sie häufig fast nur aus Bakterien und zwar den verschiedensten Formen derselben zu bestehen. Untersucht man aber dasselbe Material dann mittels der Plattenkultur-Methode, so bleibt die Anzahl der zur Entwicklung kommenden Bakterienkolonien nicht selten ganz erheblich hinter den Erwartungen zurück und im Gegensatz zu der Mannichfaltigkeit des mikroskopischen Bildes gehören die gewachsenen Bakterien verhältnismäßig wenigen Arten an. Es liegt nahe, die Erklärung für diese Thatsache in zwei Umständen zu suchen, nämlich teils darin, daß viele mit dem Kot entleerte Bakterien bereits abgestorben sind, teils darin, daß unsere Züchtungsverfahren vielen Kotbakterien nicht die geeigneten Lebensbedingungen bieten.

1) Billroth, Untersuchungen über die Vegetationsform von *Coccobacteria septica*, 1874, S. 94.

2) Escherich, Die Darmbakterien des Säuglings, 1886.

3) Suchsdorff, Archiv f. Hygiene, Bd. IV, 1886.

4) Nuttal und Thierfelder, Hoppe-Seylers Zeitschr. f. physiol. Chemie, Bd. XXI, 1895.

5) Schottelius, Archiv f. Hygiene, Bd. XXXIV, 1899.

Von diesen Gesichtspunkten ausgehend, habe ich mich bemüht, bei der Untersuchung zahlreicher Kotproben sowohl die Nährböden als auch die sonstigen Kulturbedingungen möglichst zu variieren und damit zur Klärung jener Fragen einen Beitrag zu liefern.

Herrn Geh. Medizinalrat Prof. Dr. Gaffky spreche ich für die liebenswürdige Unterstützung und mannigfache Raterteilung im Verlaufe der vorliegenden Arbeit meinen herzlichsten Dank aus.

I. Untersuchungsmethoden.

Ich brachte eine annähernd 1 mg haltende Platinöse frisch entnommener normaler menschlicher Fäces in ein mit 10 ccm sterilisierten Wassers oder Peptonbouillon gefülltes Reagenzgläschen und entnahm nach sorgfältigem Schütteln der Mischung mit einer sterilisierten Pipette $\frac{1}{2}$ bzw. $\frac{1}{4}$ ccm, die ich einem zweiten, gleichfalls mit 10 ccm sterilisierten Wassers oder Peptonbouillon gefüllten Gläschen zusetzte. Von dem letzteren Mischwasser entnahm ich 0,1 bzw. 0,05 ccm, die ich dem verflüssigten sterilen Nährboden, nachdem derselbe in Petrische Schalen ausgegossen war, zusetzte und durch Bewegen der Platten vor dem Erstarren gut verteilte.

Die Platten wurden teils unter Luftzutritt, teils unter H_2 , unter CO_2 oder unter Fäulnisgasen, welche aus faulem Fleisch sich entwickelten, bei verschiedenen Temperaturen gehalten. Nach 2 bis 4 Tagen wurden die Kolonien, welche auf den Platten sich entwickelt hatten, gezählt, genau untersucht und diagnostiziert. Um vergleichbare Zahlen zu gewinnen, berechnete ich stets den Bakteriengehalt für 1 mg Kot, entsprechend dem Gehalt der bei allen Versuchen benutzten Platinöse.

Jeder, der sich mit Züchtung von Anaëroben beschäftigt hat, wird zugeben müssen, daß die bezüglichlichen Methoden von dem Ideal eines handlichen Verfahrens meist noch weit entfernt sind. Ich habe mich anfänglich des Botkinschen Apparates bedient, mir dann aber wegen der Unhandlichkeit desselben einen Apparat konstruiert, dessen Hauptbestandteile eine Glocke von 22 cm Höhe und 13 cm Durchmesser ist; oben befindet sich ein Ansatzrohr mit Hahn. Die Glocke steht auf einer Glasplatte von circa 18 cm Durchmesser. Die Glasplatte ruht auf einem Fuß und hat in ihrer Mitte die Abströmungsöffnung, an welche ein durch Hahn verschließbares Gasrohr angesetzt ist.

Der Apparat wird folgendermaßen benutzt: Zunächst wird das Innere der Glocke und die Glasplatte mit Sublimat ausgewaschen und das Sublimat durch Alkohol und Äther entfernt. Die Etagère zur Aufnahme der Petrischen Schalen wird durch Erhitzen in der Flamme des Bunsenbrenners

sterilisiert. Es werden dann von dem zu untersuchenden Material Gelatine- oder Agarplatten gegossen und diese übereinander ohne Deckel auf die Etagen des Drahtgestelles gesetzt. Nachdem man letzteres auf die Glasplatte gesetzt hat, werden der Glockenrand und beide Hähne mit Mischwachs, aus 2 Teilen Schweinfett und 1 Teil Bienenwachs bereitet, beschmiert und Glocke und Glasplatte in möglichst enge Berührung gebracht. Nun wird das Gas durchgeleitet. Nach $\frac{1}{2}$ Stunde spätestens ist der ganze Glockenraum mit Gas gefüllt und die Hähne sind zu schliessen. Hierauf läßt man den Apparat im Zimmer stehen oder bringt ihn in einen Brütöfen. Der Apparat kann bis zu 20 Platten aufnehmen. Bei Wasserstofffüllung habe ich mich durch die Probe mit alkalischer Pyrogalluslösung überzeugt, daß der Sauerstoff vollständig entfernt war.

Von Nährböden¹⁾, die ich nach Möglichkeit variiert habe, benutzte ich folgende:

1. Gewöhnliches Nähr-Agar (Fleischwasser mit 2% Agar, 1% Pepton, 0,5% Kochsalz).
 2. Glycerin-Agar (Fleischwasser-Pepton-Agar + 6% Glycerin).
 3. Traubenzucker-Agar (Fleischwasser-Pepton-Agar + 1% Traubenzucker).
 4. Darmschleimhaut-Agar
 5. Leber-Agar
 6. Pankreas-Agar
 7. Milz-Agar
 8. Hirn-Agar
- } sind wie das gewöhnliche Nähragar bereitet,
} nur wurden anstatt Rindfleisch die genannten
} Organe gebraucht.
9. Leber-Galle Agar (500 g gehackte Ochsenleber und 30 g Erbsenmehl wurden mit 1 l Wasser gekocht. Die abgekühlte Flüssigkeit wurde mit 0,7% Pepton, 0,5% Kochsalz, 0,02% HCl versetzt und nach sorgfältigem Schütteln bei 37° C. 3 Stunden lang stehen gelassen. Darnach wurden 600 g Ochsen-galle hinzugesetzt und das Ganze wieder 3 Stunden lang bei 37° C. stehen gelassen. Hierauf wurde wie bei der Darstellung der gewöhnlichen Agar-Nährböden gekocht, filtriert, Agar zugesetzt, wieder filtriert und sterilisiert. Dieser Nährboden reagierte alkalisch, trotz dem Zusatz von 0,02% HCl).
10. Gall-Agar
 11. Harn-Agar
 12. Bierwürze-Agar
- } Wie gewöhnliches Agar bereitet, statt des
} Fleischwassers aber Galle, Harn, Bierwürze
} verwendet. Die Galle war Mischgalle von
} Rindvieh und Schwein.
13. Fäces-Agar (statt des Rindfleisches des gewöhnlichen Nähr-Agars wurde fester Menschenkot verwendet).
14. Reis-Agar
 15. Erbsen-Agar
- } statt des Fleisches Reis, bzw. Erbsen ver-
} wendet.
16. Die gebräuchliche Nährgelatine (10% Gelatine).

1) Soweit über die Reaktion der Nährböden besondere Angaben nicht gemacht worden sind, handelte es sich stets um neutralisierte Nährböden.

17. Bierwürze-Gelatine
18. Harngelatine . . .
19. Stroh-Gelatine (Strohdekot diente anstatt der Fleischbrühe; die Reaktion war sauer).
20. Verschiedene der vorstehend aufgeführten Agar-Nährböden mit Zusatz von wechselnden Mengen Galle.
21. Desgl. mit wechselnden Mengen Salzsäure.
22. Desgl. mit wechselnden Mengen Natriumcarbonat.
23. Nähr-Agar mit angefaultem Fleisch bereitet.
24. Nähr-Agar mit angefaultem Pankreas bereitet.
25. Nähr-Agar, bei dessen Bereitung statt Fleischbrühe 10 Tage bei Zimmertemperatur gefaulte Galle verwendet wurde.
26. Nähr-Agar mit zersetzter Milch verschiedenen Alters statt der Fleischbrühe bereitet, teils sauer, teils neutralisiert.
27. Nähr-Agar mit angefaultem Reisdekot statt der Fleischbrühe bereitet, teils sauer, teils neutralisiert.
28. Desgl. mit angefaultem Erbsendekot.
29. Desgl. mit angefaulten Infusen von Gallenblasen verschiedener Tiere.

II. Untersuchungsergebnisse bezüglich der Zahl der Fäcesbakterien.

Folgende Tabellen zeigen die Anzahl der Kolonien, berechnet auf die stets gleiche, annähernd 1 mg betragende Menge der frischen Fäces.

Jeder »Versuch« bezieht sich auf eine und dieselbe Kotprobe. Wo dasselbe Material mittels mehrerer Plattenkulturen untersucht worden ist, habe ich das in den Tabellen ersichtlich gemacht.

Versuch 1.

Nährböden		Anzahl der Kolonien pro ca. 1 mg	
		aërob bei 37° C.	anaërob bei 37° C.
Gewöhnliches Agar	Platte a	10 500	26 250
	» b	26 250	32 550
	im Mittel	18 375	29 400
Traubenzucker-Agar	Platte a	21 000	23 100
	» b	22 050	31 500
	im Mittel	21 525	27 300

Versuch 2.

Nährböden		Anzahl der Kolonien pro ca. 1 mg	
		aërob bei 37° C.	anaërob bei 37° C.
Angef. Erbsen-Agar (bei 37° C. ca. 10 Tage lang gefault)	Platte a	113 400	341 250
	» b	116 550	295 050
	» c	72 450	337 050
	» d	91 350	280 350
	» e	67 200	keine Platte gegossen
	» f	69 300	» » »
	» g	66 150	» » »
	im Mittel	85 200	313 425

Versuch 3.

Nährböden		Anzahl der Kolonien pro ca. 1 mg	
		aërob bei 37° C.	anaërob bei 37° C.
Angef. Erbsen-Agar (bei 37° C. ca. 10 Tage lang gefault)	Platte a	15 015	12 285
	» b	13 650	keine Platte gegossen
	» c	6 825	» » »
	im Mittel	11 830	12 285
Angef. Fleisch-Agar (bei 37° C. ca. 7 Tage lang gefault)	Platte a	19 110	0
	» b	10 920	0
	» c	9 555	0
	im Mittel	13 195	0

Versuch 4.

Nährböden		Anzahl der Kolonien pro 1 mg	
		aërob bei 37° C.	anaërob bei 37° C.
Gewöhnliches Agar		10 290	180 810
Angef. Reis-Agar (bei 37° C. ca. 14 Tage lang gefault)	Platte a	58 800	706 210
	» b	29 400	782 040
	» c	44 100	520 380
	» d	94 080	keine Platte gegossen
	im Mittel	54 095	669 543
Angef. Fleisch-Agar (bei 37° C. ca. 7 Tage gefault)	Platte a	14 700	keine Platte gegossen
	» b	5 880	} 39 690
	im Mittel	10 290	

Versuch 5.

Nährböden		Anzahl der Kolonien pro ca. 1 mg	
		aërob bei 37° C.	anaërob bei 37° C.
Gewöhnliches Agar	Platte a	943 740	1 496 460
	» b	1 137 780	1 240 680
	im Mittel	1 040 760	1 368 570
Angef. Reis-Agar (bei 37° C. ca. 14 Tage gefault)	Platte a	1 585 070	1 841 910
	» b	1 126 000	1 683 560
	im Mittel	1 355 535	1 762 735
Angef. Fleisch-Agar (bei 37° C. 7 Tage lang gefault)	Platte a	680 810	keine Platte gegossen
	» b	784 980	
	im Mittel	732 895	
Angef. Galle-Agar (bei 20° C. ca. 10 Tage lang gefault)	Platte a	136 710	621 810
	» b	130 830	476 280
	» c	98 490	keine Platte gegossen
	» d	74 970	» » »
	im Mittel	110 222	549 045

Versuch 6.

Nährböden		Anzahl der Kolonien pro ca. 1 mg	
		aërob bei 37° C.	aërob bei 37° C.
Gewöhnliches Agar		66 150	
Glycerin-Agar	Platte a	63 000	Angef. Erbsen-Agar
	» b	47 250	» b
	» c	78 750	(bei 37° C.)
	im Mittel	63 000	ca. 10 Tage gefault)
Angef. Reis-Agar (bei 37° C. 14 Tage gefault)	Platte a	22 050	Platte a
	» b	Platte verunglückt	» b
	» c	69 300	» c
	» d	28 350	» d
	im Mittel	36 566	im Mittel
			Angef. Fleisch-Agar
			(bei 37° C.)
			ca. 7 Tage gefault)
			im Mittel

Versuch 7.

Nährböden		Anzahl der Kolonien pro ca. 1 mg	
		aërob bei 37° C.	aërob bei 37° C.
Gewöhnliches Agar	Platte a	15 015	Galle-Agar
	» b	17 745	Platte a
	» c	13 650	» b
	im Mittel	15 470	» c
			» d
			im Mittel

Versuch 8.

Nährböden		Anzahl der Kolonien pro 1 mg	
		aërob bei 37° C.	anaërob bei 37° C.
Glycerin-Agar	Platte a	14 333	85 998
	» b	42 999	keine Platte gegossen
	im Mittel	28 666	85 998
Angef. Fleisch-Agar (bei 37° C. ca. 7 Tage gefault)	Platte a	0	0
	» b	0	0
	im Mittel	0	0
Angef. Erbsen-Agar (bei 37° C. ca. 10 Tage gefault)	Platte a	71 665	keine Platte gegossen
	» b	57 332	
	» c	85 998	
	» d	42 999	
	im Mittel	65 748	
Angef. Reis-Agar (bei 37° C. ca. 14 Tage gefault)	Platte a	71 665	186 329
	» b	71 665	200 662
	im Mittel	71 665	193 495

Versuch 9.

Nährböden		Anzahl der Kolonien pro ca. 1 mg	
		aërob bei 37° C.	anaërob bei 37° C.
Neutrales Pankreas-Agar	Platte a	1 614 580	3 860 560
	» b	2 070 090	keine Platte gegossen
	im Mittel	1 842 335	3 860 560
Schwach alkalisch. Pankreas-Agar		1 673 210	1 885 180
Leber-Agar	Platte a	2 092 640	13 701 380
	» b	2 169 310	18 265 500
	» c	2 223 430	keine Platte gegossen
	im Mittel	2 161 793	15 983 440
Milz-Agar	Platte a	1 760 460	1 776 940
	» b	1 772 430	1 898 710
	im Mittel	1 766 445	1 837 825
Darmschleimhaut-Agar	Platte a	2 137 740	3 580 940
	» b	1 867 140	keine Platte gegossen
	» c	2 430 890	» » »
	im Mittel	2 145 167	3 580 940
Hirn-Agar	Platte a	2 516 580	2 791 690
	» b	2 119 700	2 403 830
	im Mittel	2 318 140	2 597 760

Versuch 10.

Nährböden		Anzahl der Kolonien pro ca. 1 mg		
		aërob bei 37° C.	anaërob bei 37° C.	unter CO ₂ bei 37° C.
Gewöhnliches Agar	Platte a	58 630	97 950	31 980
	» b	keine Platte gegossen	keine Platte gegossen	53 300
	» c			74 620
	im Mittel	58 630	97 950	53 300
Hirn-Agar		74 620	815 490	111 930
Milz-Agar		42 640	154 570	106 600
Pankreas-Agar	Platte a	63 960	191 880	165 230
	» b	79 950	501 020	197 210
	» c	67 310	keine Platte gegossen	keine Platte gegossen
	im Mittel	70 400		181 220
Angef. Pankreas-Agar (bei ca. 20° C. 24 Tage gefault)	Platte a	0	0	0
	» b			
	im Mittel			
Angef. Pankreas-Agar (bei ca. 20° C. 8 Tage gefault)	Platte a	0	0	0
	» b			
	im Mittel			
Darmschleimhaut-Agar . .		53 300	143 910	37 310
Leber-Agar	Platte a	42 640	2 126 670	1 876 160
	» b	keine Platte gegossen	1 860 170	2 036 060
	» c		2 339 870	1 509 990
	» d		keine Platte gegossen	1 596 970
	im Mittel	42 640		1 754 790
Erbsen-Agar		49 970	85 280	47 970
Angef. Milch-Agar (bei ca. 20° C. 1 1/2 Jahre gefault)	Platte a	888	888	0
	» b	0	0	0
	im Mittel	444	444	0

Versuch 11.

Nährböden	Anzahl der Kolonien pro ca. 1 mg	
	aërob bei 37° C.	
Gewöhnliches Agar	315 240	
Glycerin-Agar . . .	401 680	
Galle-Agar	Platte a	372 640
	› b	289 680
	› c	285 600
	im Mittel	315 975

Nährböden	Anzahl der Kolonien pro ca. 1 mg	
	aërob bei 37° C.	
Pankreas-Agar	Platte a	310 080
	› b	383 520
	› c	252 760
	› d	327 760
	im Mittel	318 530

Versuch 12.

Nährböden		Anzahl der Kolonien pro ca. 1 mg aërob bei 37° C.	Nährböden		Anzahl der Kolonien pro ca. 1 mg aërob bei 37° C.
Glycerin-Agar	Platte a	113 190	Angef. Fleisch-Agar (bei 20° C. 9 Tage lang gefault)		85 470
	» b	102 790			
	im Mittel	107 990	Angef. Reis-Agar (bei 37° C. 7 Tage gefault)	Platte a	98 330
Galle-Agar		108 570		» b	142 065
				im Mittel	120 197
Pankreas-Agar	Platte a	109 725	Angef. Erbsen-Agar (bei 37° C. 7 Tg. gefault)	Platte a	142 065
	» b	116 655		» b	136 295
	im Mittel	112 805		im Mittel	139 185

Versuch 13.

Nährböden		Anzahl der Kolonien pro ca. 1 mg		
		aërob bei 20° C.	aërob bei 37° C.	anaërob bei 37° C.
Gewöhnliches Agar	Platte a	199 920	209 440	8 536 820
	» b	206 720	267 920	16 217 920
	im Mittel	203 320	238 680	12 344 370
Glycerin-Agar	Platte a	216 960	208 080	8 262 000
	» b	215 600	211 960	6 719 760
	im Mittel	216 280	210 020	7 490 880
Angef. Fleisch-Agar (bei 20° C. 9 Tage gefault)	Platte a	48 760	115 600	121 040
	» b	20 400	80 960	103 360
	» c	24 480	194 480	93 840
	» d	keine Platte geg.	161 840	134 640
	im Mittel	31 219	138 220	113 220
Gewöhnliche Gelatine	Platte a	233 920	keine Platte gegossen	
	» b	202 640		
	im Mittel	218 280		

Versuch 14.

Nährböden		Anzahl der Kolonien pro ca. 1 mg		
		aërob bei 20° C.	aërob bei 37° C.	anaërob bei 37° C.
Gewöhnliches Agar	Platte a	448 171	331 977	761 118
	» b	keine Platte gegossen	342 773	keine Platte gegossen
	im Mittel	448 171	337 375	761 118

Fortsetzung zu Versuch 14.

Nährböden		Anzahl der Kolonien pro ca. 1 mg		
		aërob bei 20° C.	aërob bei 37° C.	anaërob bei 37° C.
Glycerin-Agar	Platte a	353 569	485 820	882 573
	» b	keine Platte	gegossen	941 951
	im Mittel	353 569	485 820	912 267
Angef. Reis-Agar (bei 20° C. 43 Tage gefault)	Platte a	385 957	404 850	2 175 394
	» b	453 432	318 482	2 250 966
	» c	keine Platte	gegossen	keine Platte
	im Mittel	417 194	426 442	2 213 180
Neutralisiertes angef. Milch-Agar (bei 20° C. ca. 20 Tage gefault)	Platte a	302 285	358 767	259 114
	» b	326 579	399 452	251 007
	» c	keine Platte gegossen	312 385	keine Platte gegossen
	» d		393 355	
	im Mittel	314 432	365 990	255 060
Sauerer angef. Milch-Agar (bei 20° C. 20 Tage gefault) . . .		0	0	0
Gewöhnliche Nähr- Gelatine	Platte a	441 044	keine Platte gegossen	
	» b	424 850		
	im Mittel	432 947		

Versuch 15.

Nährböden		Anzahl der Kolonien pro ca. 1 mg		
		aërob bei 20° C.	aërob bei 37° C.	anaërob bei 37° C.
Gewöhnliches Agar	Platte a	264 500	185 150	449 650
	» b	keine Platte	gegossen	keine Platte
	im Mittel	264 500	198 355	449 650
Glycerin-Agar	Platte a	211 600	238 050	238 050
	» b	keine Platte gegossen	211 600	264 500
	» c		238 050	keine Platte
	im Mittel	211 600	262 567	251 275
Bierwürze-Agar	Platte a	105 800	79 350	211 600
	» b	keine Platte	gegossen	152 900
	im Mittel	105 800	52 900	182 250
Galle-Agar		keine Platte	gegossen	343 850
Angef. Gallenblase- Agar (bei 20° C. 24 Tage lang gefault)	Platte a	34 385	68 120	52 900
	» b	keine Platte	gegossen	26 450
	im Mittel	34 385	68 120	39 675

Fortsetzung zu Versuch 15.

Nährböden	Anzahl der Kolonien pro ca. 1 mg		
	aërob bei 20° C.	aërob bei 37° C.	anaërob bei 37° C.
Angef. Pankreas-Agar (bei 20° C. 24 Tage gefault)	0	0	0
Angef. Milch-Agar (bei 20° C. ca. 20 Tage gefault)	Platte a	185 150	52 900
	» b	keine Platte gegossen	238 050
	» c		152 250
	im Mittel	79 350	416 750
		185 150	94 500
Angef. Reis-Agar (bei 20° C. 43 Tage gefault)	Platte a	423 200	793 500
	» b	keine Platte gegossen	317 400
	» c		264 500
	im Mittel	335 333	793 500

Versuch 16.

Nährböden	Anzahl der Kolonien pro ca. 1 mg			
	aërob bei 20° C.	anaërob bei 20° C.	aërob bei 37° C.	anaërob bei 37° C.
Gewöhnliches Agar	Platte a	3 240 860	2 844 020	3 207 790
	» b	3 869 190	keine Platte gegossen	2 479 250
	im Mittel	3 555 525	2 844 020	2 843 520
Pankreas-Agar (neutral)	Platte a	2 447 180	2 844 020	2 116 480
	» b	3 273 910	keine Platte gegossen	3 969 480
	im Mittel	2 860 545	2 844 020	3 075 510
Angef. Pankreas-Agar (bei 20° C. 24 Tage lang gefault)	Platte a	0	0	0
	» b			
	» c			
Reaktion neutral	im Mittel			
Angef. Gallenblase-Agar (bei 20° C. ca. 20 Tage lang gefault)	Platte a	0	0	0
	» b			
	» c			
Reaktion neutral	im Mittel			
Angef. Milch-Agar (bei 20° C. ca. 20 Tage gefault)	Platte a	2 976 300	2 281 830	3 273 010
	» b	3 638 690	keine Platte gegossen	2 218 960
	im Mittel	3 307 495	2 281 830	2 447 180
Angef. Reis-Agar (bei 20° C. 43 Tage gefault)	Platte a	3 736 910	3 420 070	3 703 840
	» b	3 273 910	keine Platte gegossen	3 207 790
	im Mittel	3 505 410	3 420 070	3 042 440
			3 373 140	3 207 790

Versuch 17.

Nährböden	Anzahl der Kolonien pro ca. 1 mg			
	aërob bei 20° C.	aërob bei 37° C.	unter Fäulnis- gas bei 37° C.	
Gewöhnliches Agar	Platte a	Platte verunglückt	599 760	} keine Platte gegossen
	» b	} keine Platte gegossen	388 080	
	» c		282 240	
	im Mittel		423 360	
Glycerin-Agar	Platte a	282 240	599 760	246 960
	» b	keine Platte gegossen	529 280	keine Platte gegossen
	im Mittel	282 240	564 520	246 960
Galle-Agar		keine Platte gegossen		635 040
Bierwürze-Agar	Platte a	282 240	282 240	317 520
	» b	} keine Platte gegossen	423 360	282 240
	» c		246 960	} keine Platte gegossen
	» d		246 960	
	im Mittel	282 240	299 880	299 880
Angef. Gallenblase- Agar (bei 20° C. 24 Tage lang gefault)	Platte a	} keine Platte gegossen	Platte verunglückt	24 696
	» b		24 696	11 642
	» c		70 560	24 696
	» d		45 864	keine Platte gegossen
	im Mittel		47 040	20 675
Neutralis. angef. Pankreas-Agar (bei 20° C. ca. 20 Tg. lang gefault)		0	0	0
Angef. Milch-Agar (bei 20° C. 20 Tage lang gefault)	Platte a	423 360	564 480	458 640
	» b	} keine Platte gegossen	317 520	458 640
	» c		493 920	493 920
	» d		246 960	740 880
	im Mittel	423 360	366 912	keine Platte gegossen
Angef. Reis-Agar (bei 20° C. 43 Tage lang gefault)	Platte a	} keine Platte gegossen	670 320	423 360
	» b		keine Platte gegossen	635 040
	im Mittel		670 320	529 200
Angef. Erbsen-Agar (bei 37° C. 7 Tage gefault)		keine Platte gegossen	793 700	423 360

Versuch 18.

Nährböden	Anzahl der Kolonien pro ca. 1 mg			
	aërob bei 37° C.	anaërob bei 37° C.	unter CO ₂ bei 37° C.	unter Fäulnis- gas bei 37° C.
Gewöhnliches Agar	Platte a	182 520	280 800	262 080
	» b	201 240	} keine Platte gegossen	153 760
	» c	219 960		168 480
	im Mittel	201 573	280 800	keine Platte gegossen
			262 080	159 120
				160 450

Fortsetzung zu Versuch 18.

Nährböden		Anzahl der Kolonien pro ca 1 mg			
		aërob bei 37° C.	anaërob bei 37° C.	unter CO ₂ bei 37° C.	unter Fäulnis- gas bei 37° C.
Glycerin-Agar	Platte a	210 600	322 920	173 160	173 160
	» b	196 560	keine Platte gegossen	168 480	168 480
	» c	keine Platte gegossen	»	238 680	keine Platte gegossen
	im Mittel	203 580	322 920	193 440	170 770
Reis-Agar	Platte a	187 200	313 560	153 760	541 440
	» b	keine Platte gegossen	177 840	266 760	234 000
	» c	»	keine Platte gegossen	163 800	280 800
	im Mittel	187 200	245 700	194 773	352 080
Erbsen-Agar	Platte a	147 640	102 960	159 120	213 840
	» b	Platte verunglückt	keine Platte gegossen	196 560	keine Platte gegossen
	» c	»	»	182 520	»
	im Mittel	147 640	102 960	179 400	213 840
Bierwürze-Agar	Platte a	keine Platte gegossen	173 160	79 560	205 920
	» b		keine Platte gegossen	163 800	168 480
	» c		»	135 720	93 600
	im Mittel		173 160	126 360	156 000
Angef. Milch-Agar (bei 20° C. 20 Tage gefault)		173 160	keine Platte gegossen		
Angef. Milch-Agar (bei 20° C. ca. 1½ Jahr gefault)	Platte a	0	0	0	0
	» b				
	im Mittel				

Versuch 19.

Nährböden		Anzahl der Kolonien pro ca. 1 mg			
		aërob bei 20° C.	anaërob bei 20° C.	aërob bei 37° C.	unter Fäulnis- gas bei 37° C.
Gewöhnliches Agar	Platte a	251 680	314 600	487 630	314 600
	» b	keine Platte	gegossen	307 970	keine Platte
	im Mittel	251 680	314 600	397 800	gegossen 314 600
Fäces-Agar	Platte a	235 950	235 950	330 330	307 970
	» b	277 410	471 900	361 790	307 970
	» c	465 270	361 790	361 790	346 060
	» d	377 520	keine Platte gegossen	188 760	157 300
	» e	keine Platte gegossen		keine Platte gegossen	251 680
	» f				314 600
	» g				307 970
	» h				330 330
	im Mittel	339 042	356 547	310 667	290 480

Fortsetzung zu Versuch 19.

Nährböden	Anzahl der Kolonien pro ca. 1 mg				
		aërob bei 20° C.	anaërob bei 20° C.	aërob bei 37° C.	unter Fäulnis- gas bei 37° C.
Angef. Milch-Agar (bei 20° C. ca. 1½ Jahr lang gefault)	Platte a	78 650	125 840	47 190	31 460
	» b	62 920		125 840	21 460
	» c	62 920	keine	78 650	19 500
	» d	keine	Platte	157 200	15 730
	» e	Platte	gegossen	188 760	7 865
	» f	gegossen		188 760	keine Platte gegossen
	im Mittel	68 169	125 840	131 083	19 203

Versuch 20.

Nährböden		Anzahl der Kolonien pro ca. 1 mg				
		aerob bei 20° C.	aërob bei 37° C.	anaerob bei 37° C.	unter CO ₂ bei 37° C.	unt.Fäulnis- gas b. 37° C.
Glycerin-Agar	Platte a	154 350	198 450	198 450	220 500	396 900
	» b	keine	Platte gegossen		198 450	keine Platte gegossen
	im Mittel	154 350	198 450	198 450	209 475	396 900
Harn-Agar	Platte a	0	22 050	66 150	66 150	66 150
	» b	keine Platte gegossen	Platte ver- unglückt	22 050	keine Platte gegossen	
	im Mittel	0	22 050	44 100	66 150	
Bierwürze-Agar		154 350	242 550	154 300	220 500	keine Platte gegossen
Pankreas-Agar		keine Platte gegossen	132 300	198 450	352 800	»
Neutral. angef. Pankreas-Agar (bei 20° C. 24 Tage gefault)	Platte a	0	0	0	0	0
	» b					
	im Mittel					
Angef. Gallenblase Agar (b. 20° C. 24 Tage gefault)		keine Platte gegossen	242 550	154 300	176 400	keine Platte gegossen
Angef. Erbsen- Agar (bei 37° C. . . .)	Platte a	176 400	220 500	264 600	815 850	264 600
	» b	keine Platte gegossen	242 550	keine Platte gegossen		286 650
	» c	»	keine Platte gegossen			110 250
7 Tage gefault) im Mittel		176 400	231 525	264 600	815 850	220 250
Bierwürze-Agar	Platte a	242 550				
	» b	242 550				
	» c	242 550				
	» d	374 850				
	im Mittel	275 625				
Stroh-Gelatine (Reakt. sauer)	Platte a	66 150				
	» b	88 200				
	» c	88 200				
	» d	110 250				
	im Mittel	88 200				

Versuch 21.

Nährböden		Anzahl der Kolonien pro ca. 1 mg				
		aërob bei 20° C.	aërob bei 37° C.	anaërob bei 37° C.	unter CO ₂ bei 37° C.	unt.Fäulnis- gas b. 37° C.
Gewöhnliches Agar	Platte a	39 930	93 170	116 480	26 620	66 550
	» b	keine Platte gegossen	146 410	keine Platte gegossen	keine Platte gegossen	13 310
	» c	»	106 480	»	»	keine Platte gegossen
	» d	»	186 340	»	»	»
	im Mittel	39 930	133 100	166 480	26 620	39 930
Traubenzucker- Agar	Platte a	53 240	146 410	159 720	159 720	93 170
	» b	keine Platte gegossen	146 410	keine Platte gegossen	153 240	79 860
	» c	»	keine Platte gegossen	»	keine Platte gegossen	79 860
	im Mittel	53 240	146 410	159 720	156 480	84 397
Bierwürze-Agar	Platte a	53 240	93 170	146 410	13 310	33 100
	» b	26 620	39 930	keine Platte gegossen	keine Platte gegossen	39 930
	im Mittel		66 550	146 410	13 310	34 515
Harn-Agar	Platte a	133 100	33 275	36 603	46 585	46 585
	» b	keine Platte gegossen	46 595	keine Platte gegossen	26 620	43 258
	» c	»	79 860	»	keine Platte gegossen	43 275
	» d	»	44 880	»	»	46 595
	im Mittel	133 100	51 152	36 603	36 602	44 428
Angef. Pankreas-Agar (bei 20° C. 24 Tage lang gefault)	Platte a	0	0	13 310	0	0
	» b			keine Platte gegossen		
	» c			»		
	» d			»		
	im Mittel			13 310		
Angef. Gallen- blasen-Agar (bei 20° C. 24 Tage lang gefault)	Platte a	19 965	36 620	30 948	26 620	39 930
	» b	keine Platte gegossen	23 290	33 275	keine Platte gegossen	30 948
	» c	»	58 795	keine Platte gegossen		
	» d	»	19 965			
	im Mittel	19 965	34 668	32 111	26 620	35 439
Angef. Erbsen- Agar (bei 37° C. 7 Tage lang gefault)	Platte a	66 550	93 170	26 620	93 170	66 550
	» b	keine Platte gegossen	106 480	keine Platte gegossen		106 480
	» c	»	keine Platte gegossen			106 480
	im Mittel	66 550	99 825	26 620	93 170	90 170

Versuch 22.

Nährböden		Anzahl der Kolonien pro ca. 1 mg				
		aërob bei 20° C.	aërob bei 37° C.	anaërob bei 37° C.	unter CO ₂ bei 37° C.	unt.Fäulnis- gas b. 37° C.
Gewöhnliches Agar	Platte a	217 800	133 100	507 200	229 900	193 600
	» b	keine Platte gegossen				254 100
	im Mittel	217 800	133 100	507 200	229 900	223 850

Fortsetzung zu Versuch 22.

Nährböden		Anzahl der Kolonien pro ca. 1 mg				
		aërob bei 20° C.	aërob bei 37° C.	anaërob bei 37° C.	unter CO ₂ bei 37° C.	unt.Fäulnis- gas b. 37° C.
Glycerin-Agar	Platte a	193 600	217 800	157 300	keine Platte	121 000
	„ b	keine Platte gegossen	205 700	keine Platte gegossen	gegossen	keine Platte gegossen
	im Mittel	193 600	212 250	157 300	„	121 000
Bierwürze-Agar		18 150	290 400	331 700	193 600	290 400
Harn-Agar	Platte a	157 300	181 500	145 200	169 400	157 300
	„ b	keine Platte gegossen	181 500	keine Platte gegossen	217 800	217 800
	im Mittel	157 300	181 500	145 200	193 600	187 500
Reis-Agar	Platte a	314 600	181 500	229 900	302 500	121 000
	„ b	keine Platte gegossen	205 700	169 400	keine Platte gegossen	205 700
	im Mittel	314 600	193 600	199 650	302 500	185 530
Erbsen-Agar	Platte a	205 700	145 200	278 300	338 800	217 800
	„ b	229 900	133 100	keine Platte gegossen		169 400
	„ c	keine Platte gegossen	278 300			157 300
	„ d	„	229 900			290 400
	„ e	„	169 400			keine Platte gegossen
	im Mittel	217 800	171 180	278 300	338 800	208 725
Angef. Reis-Agar bei 20° C. 43 Tage gefault		keine Platte gegossen	242 000	keine Platte gegossen	242 000	242 000
Angef. Erbsen- Agar bei 37° C. 7 Tage lang gefault)	Platte a	278 300	290 400	266 200	338 800	217 800
	„ b	181 500	205 700	keine Platte gegossen		338 800
	im Mittel	229 900	237 967			278 300

Versuch 23.

Nährböden		Anzahl der Kolonien pro ca. 1 mg				
		aërob bei 20° C.	anaërob bei 20° C.	aërob bei 37° C.	anaërob bei 37° C.	unt.Fäulnis- gas b. 37° C.
Gewöhnliche Agar	Platte a	868 790	591 630	596 960	7 040 930	602 190
	„ b	keine Platte gegossen	687 770	658 250	12 301 640	676 910
	im Mittel	868 790	639 700	627 605	9 671 285	636 900
Glycerin-Agar	Platte a	559 650	804 830	740 870	9 128 300	575 640
	„ b	815 490	825 490	keine Platte gegossen	7 035 600	490 360
	im Mittel	682 570	815 160	740 870	8 081 950	533 000
Fäces-Agar	Platte a	826 150	655 590	631 600	10 893 250	314 470
	„ b	623 615	666 250	799 500	13 458 250	527 670
	im Mittel	724 385	660 920	715 550	12 542 843	367 103

Fortsetzung zu Versuch 23.

Nährböden		Anzahl der Kolonien pro ca. 1 mg				
		aerob bei 20° C.	anaerob bei 20° C.	aerob bei 37° C.	anaerob bei 37° C.	unter Faulnisgas bei 37° C.
Angef. Milch- Agar (bei 20° C. 1½ J. gefault)	Platte a	keine Platte gegossen	1 332	600	235 784	1 332
	„ b	„	keine Platte gegossen	600	keine Platte gegossen	
	im Mittel		1 332	600	235 784	1 332
Gewöhnliche (Gelatine)	Platte a	874 120	794 170	keine Platte gegossen		
	„ b	746 200	916 760			
	„ c	791 530	852 800			
	„ d	676 950	keine Platte gegossen			
	im Mittel	772 200	854 244			
Traubenzucker-Gelatine		606 350	keine Platte gegossen			
Bierwürze-Agar	Platte a	474 370	627 670	keine Platte gegossen		
	„ b	623 610	415 740			
	„ c	keine Platte gegossen	543 660			
	im Mittel	548 990	529 027			
Stroh-Gelatine (Reakt. sauer)	Platte a	0	0			
	„ b					
	„ c					
	im Mittel					

Versuch 24.

Nährböden		Anzahl der Kolonien pro ca. 1 mg				
		aërob bei 20° C.	anaërob bei 20° C.	unter Fäulnisgas bei 20° C.	aërob bei 37° C.	anaërob bei 37° C.
Gewöhnliches Agar	Platte a	keine Platte gegossen		111 930	90 610	4 749 030
	„ b			keine Platte	keine Platte	2 483 780
	„ c			gegossen	gegossen	3 027 440
	im Mittel			111 930	90 610	3 420 083
Glycerin-Agar		101 270	keine Platte gegossen	90 610	122 590	3 778 970
Pankreas-Agar	Platte a	keine Platte gegossen			84 280	7 659 370
	„ b				117 260	keine Platte gegossen
	im Mittel				101 270	7 659 370
Darmschleim- haut-Agar	Platte a	101 270	79 290	53 300	95 940	2 590 280
	„ b	111 930	keine Platte gegossen	95 940	111 930	3 347 240
	„ c	keine Platte gegossen				5 825 690
	„ d					4 706 390
	„ e					3 810 950
	im Mittel	106 600	79 290	74 620	103 435	4 056 110

Fortsetzung zu Versuch 24.

Nährböden		Anzahl der Kolonien pro ca. 1 mg				
		aerob bei 20° C.	anaerob bei 20° C.	unt. Fäulnis- gas b. 20° C.	aerob bei 37° C.	anaerob bei 37° C.
Fäces-Agar	Platte a	129 240	keine Platte gegossen	129 240	106 600	4 951 570
	„ b	keine Platte gegossen	„	31 980	133 250	keine Platte gegossen
	im Mittel	129 240	„	80 610	119 925	4 951 570
Ang. Pankreas- Agar (bei 20° C. 24 Tage gefault) Reakt. neutral	Platte a	0	0	0	0	0
	„ b					
	im Mittel					
Gewöhnliche Gelatine	Platte a	keine Platte gegossen	106 600	101 270	keine Platte gegossen	
	„ b	„	79 290	191 880		
	im Mittel	„		146 075		
Stroh-Gelatine (Reakt. sauer)	Platte a	90 610	0	84 280		
	„ b	0		keine Platte gegossen		
	„ c	keine Platte gegossen		„		
	im Mittel	45 305		84 280		

Versuch 25.

Nährböden		Anzahl der Kolonien pro ca. 1 mg				
		aerob bei 20° C.	anaerob bei 20° C.	aerob bei 37° C.	anaerob bei 37° C.	unter CO ₂ bei 37° C.
Gewöhnliches Agar . . .		keine Platte gegossen		93 170	keine Platte gegossen	
Glycerin-Agar		239 580	keine Platte gegossen	232 890	146 410	
Reis-Agar	Platte a	199 650	keine Platte gegossen	106 480	279 510	119 790
	„ b	keine Platte gegossen	„	keine Platte gegossen	412 610	keine Platte gegossen
	im Mittel	199 650	„	106 480	346 060	119 790
Hirn-Agar		keine Platte gegossen		186 340	212 960	keine Platte gegossen
Milz-Agar		306 230	keine Platte gegossen	133 100	Platte ver- unglückt	146 410
Galle-Agar	Platte a	13 310	93 170	133 100	133 100	186 340
	„ b	Platte ver- unglückt	keine Platte gegossen	Platte ver- unglückt	106 480	keine Platte gegossen
	„ c	„	„	„	199 650	„
	im Mittel	13 310	93 170	133 100	136 743	186 340
Leber-Agar	Platte a	199 650	199 650	159 720	199 650	598 950
	„ b	146 410	keine Platte gegossen	186 340	186 340	399 300
	„ c	keine Platte gegossen			279 510	545 710
	„ d				306 130	keine Platte gegossen
	„ e				279 510	„
	im Mittel	173 030	199 650	173 030	250 228	514 653
Leber-Galle- Agar (Nr. 9)	Platte a	133 100	139 720	199 650	199 650	625 570
	„ b	186 340	119 790	159 720	146 410	666 550
	„ c	186 340	119 790	153 030	133 100	keine Platte gegossen
	„ d	keine Platte gegossen	226 270	153 030	226 270	„
	„ e	keine Platte gegossen			226 270	„
	„ f				385 990	„
im Mittel		168 590	151 365	166 360	219 615	646 060

Versuch 26.

Nährböden		Anzahl der Kolonien pro ca. 1 mg	
		aërob bei 37° C.	anaërob bei 37° C.
Gewöhnliches Agar	Platte a	1 774 480	5 366 080
	» b	1 938 480	6 137 280
	» c	1 594 080	6 979 840
	im Mittel	1 769 013	5 831 067
Hirn-Agar	Platte a	1 751 520	4 329 600
	» b	2 214 000	3 306 240
	im Mittel	1 982 760	3 817 970
Leber-Agar	Platte a	1 472 720	6 314 000
	» b	1 712 160	13 284 000
	im Mittel	1 592 440	9 799 000
Milz-Agar	Platte a	990 560	5 497 280
	» b	1 230 080	5 930 240
	im Mittel	1 110 320	5 713 760
Darmschleimhaut-Agar	Platte a	1 741 680	11 414 400
	» b	1 899 120	6 642 000
	» c	1 725 280	keine Platte gegossen
	im Mittel	1 788 690	8 528 200
Pankreas-Agar (neutral)	Platte a	1 613 760	7 633 840
	» b	1 836 800	6 592 800
	im Mittel	1 725 280	6 613 320
Neutralisiertes angef. Pankreas-Agar (bei 20° C. 24 Tage lang gefault)		0	0
Neutralisiertes Pankreas-Agar + 0,000017% HCl	Platte a	1 472 720	6 008 960
	» b	1 423 520	3 110 800
	im Mittel	1 448 120	4 559 800
Dasselbe + 0,00002% HCl		639 600	6 986 400
Dasselbe + 0,00004% HCl	Platte a	885 600	8 632 960
	» b	144 320	7 863 840
	im Mittel	514 960	8 248 400
Fäces-Agar		1 151 280	1 482 560

Versuch 27.

Nährböden		Anzahl der Kolonien pro ca. 1 mg	
		aërob bei 37° C.	anaërob bei 37° C.
Gewöhnliches Agar + 0,005% HCl (sehr schwach sauer)	Platte a	85 575	126 000
	» b	91 350	keine Platte gegossen
	» c	135 975	
	im Mittel	104 300	

Fortsetzung zu Versuch 27.

Nährböden	Anzahl der Kolonien pro ca. 1 mg		
	aërob bei 37° C.	anaërob bei 37° C.	
Angef. Reis-Agar (bei 37° C. ca. 10 Tage gefault) + 0,005% HCl (sehr schwach sauer)	Platte a » b im Mittel	66 150 75 600 70 875	133 350 137 550 135 450
Angef. Erbsen-Agar (bei 37° C. ca. 10 Tage gefault) + 0,005% HCl (sehr schwach sauer)	Platte a » b » c im Mittel	187 150 144 900 226 000 186 017	192 150 keine Platte gegossen 192 150
Angef. Gallen-Agar (bei 37° C. 7 Tage gefault) + 0,005% HCl (sehr schwach sauer)	Platte a » b im Mittel	6 300 3 150 4 725	36 750 29 400 33 075
Angef. Fleisch-Agar (b. 37° C. 7 Tage gefault) + 0,005% HCl (sehr schwach sauer)	Platte a » b im Mittel	43 050 44 625 43 837	26 250 103 950 65 050

Versuch 28.

Nährböden	Anzahl der Kolonien pro ca. 1 mg	Nährböden	Anzahl der Kolonien pro ca. 1 mg
	aërob b. 37°C		aërob b. 37°C
Gewöhnliches Agar	Platte a » b im Mittel	Angef. Reis-Agar (bei 37° C. ca. 14 Tage gefault) + 0,1% HCl (Reaktion sauer)	Platte a » b » c im Mittel
	15 015 16 385 15 700		0
Angef. Gallen-Agar (bei 20° C. ca. 7 Tage gefault) + 0,1% HCl (Reaktion sauer)	Platte a » b » c im Mittel	Dasselbe + 0,2% HCl (sauer)	Platte a » b » c im Mittel
	1 365 1 365 1 365 1 365		0

Versuch 29.

Nährböden	Anzahl der Kolonien pro ca. 1 mg	Nährböden	Anzahl der Kolonien pro ca. 1 mg
	aërob b. 37°C		aërob b. 37°C
Gewöhnliches Agar	Platte a » b im Mittel	Angef. Reis-Agar (bei 37° C. 14 Tage gefault) + 0,1% HCl (sauer)	Platte a » b
	53 235 64 155 58 695		0
Angef. Gallen-Agar (bei 20° C. 7 Tage gefault) + 0,1% HCl (sauer)	Platte a » b im Mittel	Dasselbe + 0,2% HCl	Platte a » b
	12 285		0

Versuch 30.

Nährböden		Anzahl der Kolonien pro ca. 1 mg aërob b. 37°C	Nährböden		Anzahl der Kolonien pro ca. 1 mg aërob b. 37°C
Gewöhnliches Agar	Platte a	261 450	Angef. Gallen-Agar (bei 20° C. 7 Tage gefault) + 0,1% HCl (sauer)	Platte a	85 050
	„ b	261 450		„ b	69 300
	„ c	233 100		„ c	63 000
	„ d	274 050		„ d	44 100
	im Mittel	257 512		im Mittel	65 362
Gewöhnliches Agar + 0,1% HCl (sauer)	Platte a	201 600	Angef. Reis-Agar (bei 37° C. 7 Tage lang gefault)	Platte a	280 350
	„ b	163 800		„ b	349 650
	„ c	226 800		„ c	270 900
	„ d	228 850		„ d	207 900
	„ e	289 800		„ e	222 550
	im Mittel	222 130		„ f	315 000
Angef. Erbsen-Agar (bei 37° C. 7 Tage gefault)	Platte a	233 100		im Mittel	274 392
	„ b	223 650	Dasselbe + 0,1% HCl (sauer)	Platte a	}
	„ c	185 850		„ b	
	„ d	179 550		„ c	
	„ e	239 500		„ d	
	im Mittel	212 330			0

Versuch 31.

Nährböden		Anzahl der Kolonien pro ca. 1 mg aërob bei 37° C. anaërob b. 37° C.	
Gewöhnliches Agar		223 800	3 981 600
Darmschleimhaut-Agar	Platte a	105 840	1 479 240
	„ b	118 800	1 249 920
	„ c	118 440	keine Platte gegoss.
	im Mittel	114 373	1 364 580
Pankreas-Agar (schwach alkalisch)	Platte a	103 320	10 206 000
	„ b	115 920	3 774 960
	„ c	108 260	4 490 640
	„ d	100 800	11 070 360
	im Mittel	107 075	7 385 490
Dasselbe + 0,00002% HCl (neutral)	Platte a	70 560	75 900
	„ b	58 080	82 960
	„ c	100 800	111 320
	„ d	keine Platte gegoss.	113 850
	im Mittel	76 480	96 007
Dasselbe + 0,00004% HCl (neutral)		216 240	118 916

Fortsetzung zu Versuch 31.

Nährböden		Anzahl der Kolonien pro ca. 1 mg	
		aërob bei 37° C.	anaërob b. 37° C.
Schwach saures Pankreas-Agar	Platte a	78 120	4 103 000
	» b	keine Platte gegoss.	2 958 480
	im Mittel	78 120	3 530 740
Schwach alkalisches Pankreas-Agar	Platte a	105 840	118 440
	» b	75 600	95 760
	im Mittel	90 720	107 100
Angef. Pankreas-Agar (bei 20° C. 8 Tage gefault)	Platte a	0	0
	» b		
	» c		
Dasselbe (bei 20° C. 24 Tage gefault)	Platte a	0	0
	» b		
	» c		

Versuch 32.

Nährböden		Anzahl der Kolonien pro ca. 1 mg	
		aërob bei 37° C.	anaërob b. 37° C.
Glycerin-Agar		40 180	1 974 560
Schwach alkalisches Pankreas-Agar	Platte a	22 960	4 500 160
	» b	22 960	1 613 740
	» c	28 700	843 780
	» d	51 660	863 000
	im Mittel	31 570	1 955 420
Dasselbe + 0,2% Soda	Platte a	5 740	10 480
	» b	5 740	10 480
	» c	5 740	40 180
	» d	17 220	22 960
	im Mittel	8 585	21 025
Dasselbe + 0,5% Soda	Platte a	0	5 740
	» b		5 740
	» c		5 740
	» d		10 480
	» e		5 740
	im Mittel		6 688
Dasselbe + 0,8% Soda	Platte a	0	0
	» b		
	» c		
	» d		
	» e		

Fortsetzung zu Versuch 32.

Nährböden	Anzahl der Kolonien pro ca. 1 mg	
	aërob bei 37° C.	anaërob b. 37° C.
Dasselbe + 1% Soda	0	0

Versuch 33.

Nährböden	Anzahl der Kolonien pro ca. 1 mg	
	aërob bei 37° C.	anaërob b. 37° C.
Traubenzucker-Agar	keine Platte gegoss.	27 930
Traubenzuckeragar + 10% Galle	Platte a 119 070 „ b 114 660 im Mittel 116 865	58 800 42 630 50 715
Angef. Erbsen-Agar (bei 37° C. 10 Tage gefault) + 10% Galle	Platte a 196 980 „ b 196 980 im Mittel 196 980	139 650 198 450 169 050
Angef. Fleisch-Agar (bei 37° C. 7 Tage gefault) + 10% Galle	Platte a 126 060 „ b 204 620 im Mittel 165 340	} 0

Versuch 34.

Nährböden	Anzahl der Kolonien pro ca. 1 mg	
	aërob bei 37° C.	anaërob b. 37° C.
Gewöhnliches Agar	Platte a 27 840 „ b 34 280 im Mittel 31 560	72 030 keine Platte gegoss. 72 030
Traubenzucker-Agar + 5% Galle	Platte a 7 350 „ b 5 880 „ c 1 470 im Mittel 4 700	20 580 keine Platte gegossen 20 580
Angef. Erbsen-Agar (bei 37° C. 7 Tage gefault) + 5% Galle	Platte a 7 350 „ b 2 940 im Mittel 5 140	61 740 54 390 58 065
Angef. Fleisch-Agar (bei 37° C. 7 Tage gefault) + 5% Galle	Platte a 2 940 „ b keine Platte gegoss. im Mittel 2 940	} 0

Versuch 35.

Nährböden		Anzahl der Kolonien pro ca. 1 mg	Nährböden		Anzahl der Kolonien pro ca. 1 mg
		aërob b. 37°C			aërob b. 37°C
Gewöhnliches Agar	Platte a	735 420	Dasselbe + 33% Galle	Platte a	874 770
	» b	692 150		» b	731 850
	im Mittel	713 785		» c	928 200
Dasselbe + 2,5% Galle	Platte a	717 570	Angef. Fleisch-Agar (bei 20° C. 9 Tage gefault) + 2,5% Galle	im Mittel	844 940
	» b	510 510		Platte a	760 410
	» c	922 480		» b	656 880
	» d	428 400		im Mittel	708 645
Dasselbe + 5% Galle	im Mittel	644 740	Dasselbe + 5% Galle	Platte a	599 760
	Platte a	774 690		» b	503 370
	» b	649 740		im Mittel	551 565
	» c	656 880		Dasselbe + 20% Galle	831 810
Dasselbe + 20% Galle	im Mittel	693 774	Angef. Erbsen-Agar (b. 37° C. 7 Tg. gefault) + 2,5% Galle	Dasselbe + 5% Galle	806 820
	Platte a	846 090			
	» b	610 470			
	» c	810 390			
	» d	874 650			
	im Mittel	785 400			

Versuch 36.

Nährböden		Anzahl der Kolonien pro 1 mg	
		aërob bei 37° C.	anaërob b. 37° C.
Gewöhnliches Agar		803 400	1 565 200
Glycerin-Agar		1 177 800	947 700
Pankreas-Agar	Platte a	837 200	1 189 500
	» b	913 900	1 084 200
	» c	1 033 500	1 684 800
	» d	965 900	keine Platte gegoss.
	im Mittel	937 625	1 319 500
Galle-Agar	Platte a	1 175 200	638 300
	» b	1 029 600	keine Platte gegoss.
	im Mittel	1 102 400	638 300
Angef. Fleisch-Agar (bei 20° C. 7 Tage gefault)	Platte a	742 300	486 200
	» b	711 100	596 700
	im Mittel	726 700	541 450

Fortsetzung zu Versuch 36.

Nährböden	Anzahl der Kolonien pro 1 mg		
	aërob bei 37° C.		anaërob b. 37° C.
Angef. Reis-Agar (bei 37° C. 7 Tage gefault)	Platte verunglückt		4 382 300
Angef. Erbsen-Agar (bei 37° C. 7 Tage lang gefault)	Platte a	1 411 800	1 102 400
	„ b	1 326 000	keine Platte gegoss.
	im Mittel	1 236 890	1 102 400
Gewöhnliche Gelatine (bei 20° C.)	Platte a	1 222 000	keine Platte gegossen
	„ b	1 216 800	
	„ c	793 000	
	im Mittel	1 077 266	

Wie die Tabellen zeigen, ergaben sich bei der quantitativen bakteriologischen Untersuchung der Fäces erhebliche Unterschiede je nach der Art der gewählten Züchtungsbedingungen. Außerdem verhielten sich aber auch die verschiedenen Kotproben überaus ungleich. Die nachstehende Tabelle möge einen Überblick darüber geben, wie groß die Kolonienzahl im Mittel, im Minimum und im Maximum in den untersuchten Kotproben bei Benutzung der günstigsten Nährböden gewesen ist.

(Siehe Übersichtstabelle auf S. 32 u. 33.)

Die größte Keimzahl, welche ich bei meinen Untersuchungen überhaupt in 1 mg Fäces gefunden habe, betrug etwa 18 Millionen. Diese Zahl erscheint immerhin gering, wenn man berücksichtigt, daß in gefärbten Ausstrich-Präparaten die Fäces oft nur aus Bakterien zu bestehen scheinen. Im Vergleich habe ich unter Benutzung verschiedener Nährböden die Keimzahl in einem Milligramm frischer, auf Schrägagar gewachsener Kultur von *Bacterium coli* ermittelt. Wie die folgende Tabelle (S. 34) zeigt, haben sich dabei sehr viel höhere Zahlen ergeben als für die Fäces.

(Siehe Tabelle auf S. 34.)

Wachstum unter Wasserstoff lieferte in der Regel viel mehr Kolonien als Wachstum bei Luftzutritt; ausnahmsweise, so in den Versuchen 1, 5, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 25 und 33, war der Unterschied in der Zahl der Kolonien aber auch nur ein geringer.

Unter CO_2 entwickelten die Kolonien sich weniger zahlreich als unter Wasserstoff. Wir fanden aber auch da Ausnahmen (bei Erbsen — angefaulten Erbsen — und Harn-Agar; Versuch 20, 22 und 25). Bemerkenswerterweise blieben die unter CO_2 zur Entwicklung gekommenen Kolonien stets ganz auffallend klein.

Bei Züchtung unter Fäulnisgasen fand ich etwas mehr Kolonien als unter CO_2 .

Die Temperatur, bei der die Platten gehalten wurden, übte auf die Zahl der aus den Fäces sich entwickelnden Kolonien unverkennbar einen Einfluß aus. Im allgemeinen wirkte die Brüttemperatur günstiger als Zimmertemperatur (vgl. Versuche 13, 17, 19, 20, 21, 23 und 24); doch kamen vereinzelt auch Ausnahmen von dieser Regel vor (vgl. Versuche 14, 15, 16 und 23.)

Im Vergleich mit dem gewöhnlichen Nähr-Agar sind nach meinen Erfahrungen im allgemeinen Glycerin-Agar, Traubenzucker-Agar, Pankreas-Agar, Darmschleimhaut-Agar und Milz-Agar fast gleich gute Nährsubstrate für die Bakterien der Fäces (vgl. Versuche 1, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24 und 26).

Die gewöhnliche Nährgelatine und die Traubenzuckergelatine verhielten sich annähernd wie das gewöhnliche Nähr-Agar.

Auf Bierwürze-Agar wuchsen die Fäcesbakterien weniger gut als auf gewöhnlichem Agar (vgl. Versuche 15, 17, 18, 20, 21 und 22).

Auf Erbsen- und Reis-Agar wuchsen sie etwa ebenso gut wie auf gewöhnlichem Agar (vgl. Versuche 10, 18, 20 und 22), dagegen auf Agar, das mit vorher angefaulten Erbsen- und Reis-Infusen bereitet war, etwas besser als auf gewöhnlichem Agar (vgl. Versuche 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17 und 22).

Auf Fäces-Agar entwickelten sich in der Regel die Kolonien minder zahlreich als auf gewöhnlichem Agar (vgl. Versuche 19, 23 und 26), nur im Versuch 24 fand ich etwas mehr Kolonien als auf gewöhnlichem Agar.

Nährböden		Bei Zimmertemperatur (18—20° C.)				
		Anzahl der Platten	aërob	Anzahl der Platten	anaërob	Anzahl der Platten unter Fäulnisgas
Gewöhnlich. Agar	Mittel		652 998		893 071	
	Minimum	19	38 268	5	27 333	1 111 930
	Maximum		3 869 190		2 844 020	
Glycerin- Agar	Mittel		587 032		815 160	
	Minimum	16	101 270	2	804 830	1 90 610
	Maximum		3 273 910		825 490	
Leber-Agar	Mittel		164 976			
	Minimum	5	92 640	1	199 650	— —
	Maximum		306 230			
Darm- schleimhaut- Agar	Mittel		106 600			74 640
	Minimum	2	101 270	1	79 290	2 53 300
	Maximum		111 930			95 940
Milz-Agar	Mittel					
	Minimum	—	—	—	—	—
	Maximum					
Galle-Agar	Mittel					
	Minimum	1	13 310	1	93 170	— —
	Maximum					
Hirn-Agar	Mittel					
	Minimum	—	—	—	—	—
	Maximum					
Pankreas- Agar	Mittel		2 860 545			
	Minimum	2	2 447 180	1	2 844 020	— —
	Maximum		3 273 910			
Fäces-Agar	Mittel		419 307		478 296	80 610
	Minimum	7	129 240	5	235 950	2 31 980
	Maximum		826 150		666 250	129 240
Reis-Agar	Mittel		357 125			
	Minimum	2	199 650	—	—	—
	Maximum		314 600			
Angefaultes Reis-Agar	Mittel		1 962 552			
	Minimum	4	385 957	1	3 420 070	— —
	Maximum		3 736 910			

belle.

Bei 37° C.							
Anzahl der Platten	aërob	Anzahl der Platten	anaërob	Anzahl der Platten	unter CO ₂	Anzahl der Platten	unter Fäulnisgas
	775 524		2 330 440		134 369		294 020
64	10 290	30	26 250	7	26 620	11	13 310
	7 460 750		16 217 920		262 080		676 910
	701 699		1 738 612		190 947		310 357
29	14 333	17	85 998	6	146 410	7	121 000
	1 177 800		9 128 300		238 680		575 640
	1 121 937		4 928 561		1 223 163		
9	42 640	12	186 340	7	399 300	—	—
	2 223 430		18 265 500		2 036 060		
	1 033 842		4 321 172				
12	53 300	10	143 910	1	37 310	—	—
	2 430 890		11 414 400				
	988 212		3 051 548		125 505		
6	42 640	5	154 570	2	106 600	—	—
	1 772 430		5 930 240		146 410		
	635 406		413 479				
12	8 190	5	106 480	1	186 340	1	635 040
	1 175 200		638 300				
	1 658 793		2 309 968				
6	74 620	6	212 960	1	111 930	—	—
	2 516 580		4 329 600				
	779 651		2 824 277		298 413		
29	63 960	26	191 880	3	165 230	—	—
	3 075 510		11 070 360		352 800		
	451 656		3 568 195				311 381
9	106 600	13	157 300	—	—	11	157 300
	1 151 280		13 458 250				527 670
	191 467		222 675		201 310		268 807
3	181 500	4	169 400	5	153 760	6	121 000
	205 700		313 560		302 500		541 440
	518 285		2 843 365				433 467
29	22 050	12	186 329	1	242 000	5	242 000
	3 703 840		4 382 300				635 040

Nährböden		Anzahl der bei 37° C. unter Luftzutritt aus ca. 1 mg Bakt. coli- Kultur gewachsenen Kolonien
Gewöhnliches Agar . . .		1 017 720 000
Darmschleimhaut- Agar	{ Platte a	843 580 000
	{ „ b	844 160 000
Leber-Agar	{ Platte a	851 400 000
	{ „ b	950 400 000
Hirn-Agar	{ Platte a	962 280 000
	{ „ b	942 480 000
Fäces-Agar		803 860 000
Pankreas-Agar	{ Platte a	696 960 000
	{ „ b	724 680 000

Galle hatte auf das Wachstum der Fäcesbakterien im allgemeinen keinen fördernden Einfluß (vgl. Versuche 11, 12, 15, und 25). Wo, wie im Versuch 17 und 36, die Kolonien auf Galle-Agar etwas zahlreicher waren als auf gewöhnlichem Agar, blieben die Kolonien unter dem Einflusse der Galle immer sehr klein. Wenn man aber einem ungünstigen Nährboden, z. B. angefaultem Fleisch-Agarnährboden, etwas Galle zugesetzte, so entwickelten sich viel mehr Kolonien als ohne Zusatz von Galle.

Hirn-Agar erwies sich meistens als günstiger Nährboden (vgl. Versuche 9, 10, 25 und 26).

Als beste Nährböden für Fäcesbakterien erwiesen sich Leber-Agar und der mit Leber bereitete zusammengesetzte Nährboden Nr. 9.

Harn-Agar war für Fäcesbakterien ungünstig; die Zahl der Kolonien war auf demselben verhältnismäßig wenig zahlreich (vgl. Versuch 20 und 21).

Angefaultes Fleisch-Agar erwies sich als ein ungünstiger Nährboden, ja wir haben auf demselben manchmal überhaupt kein Wachstum gefunden (vgl. Versuche 4, 5, 6, 8, 12 und 13).

Auf angefaultem Galle-Agar betrug die Zahl der Kolonien nur ca. $\frac{1}{10}$ derjenigen auf gewöhnlichem Agar (vgl. Versuch 5).

Versuch 39. (Kotprobe, 20 Minuten auf 79—81° C. erhitzt.)

Nährböden	Anzahl der Kolonien pro ca. 1 mg			
	aërob bei 20° C.		anaërob bei 20° C.	
	Kontrolle (nicht erhitzt)	erhitzt	Kontrolle (nicht erhitzt)	erhitzt
Gewöhnliches Agar	38 268	7	27 333	5
Gewöhnliche Gelatine { Platte a	—	20	—	5
> b	—	14	—	0
Reis-Agar { Platte a	—	0	—	0
> b	—	0	—	0
Darmschleimhaut-Agar { Platte a	—	11	—	2
> b	—	0	—	2

Versuch 40. (Kotprobe, 10 Minuten auf 84—86° C. erhitzt.)

Nährböden	Anzahl der Kolonien pro ca. 1 mg			
	aërob bei 37° C.		anaërob bei 37° C.	
	Kontrolle (nicht erhitzt)	erhitzt	Kontrolle (nicht erhitzt)	erhitzt
Gewöhnliches Agar { Platte a	1 817 700	448	2 090 281	Platte verun- glückt
> b	—	382	—	
> c	—	314	—	
Angef. Fleisch-Agar (b. 20° C. 9 Tage gefault)	—	130	—	31
Angef. Reis-Agar (b. { Platte a	—	187	—	65
37° C. 7 Tg. gefault) { > b	—	236	—	55
Angef. Erbsen-Agar { Platte a	—	293	—	435
(b. 37° C. 7 Tg. gefault) { > b	—	407	—	736

Versuch 41. (Kotprobe, 10 Minuten auf 89—91° C. erhitzt.)

Nährböden	Anzahl der Kolonien pro ca. 1 mg			
	aërob bei 37° C.		anaërob bei 37° C.	
	Kontrolle (nicht erhitzt)	erhitzt	Kontrolle (nicht erhitzt)	erhitzt
Gewöhnliches Agar	1 522 050	2 167	1 871 440	3 665
Angef. Fleisch-Agar (b. 20° C. 9 Tage gefault)	—	697	—	16
Angef. Erbsen-Agar { Platte a	—	2 177	—	1 288
(b. 37° C. 7 Tg. gefault) { > b	—	2 227	—	2 936
Angef. Reis-Agar (bei 37° C. 7 Tage gefault)	—	2 005	—	1 620

Versuch 42. (Kotprobe, 10 Minuten auf 98° C. erhitzt.)

Nährböden		Anzahl der Kolonien pro ca. 1 mg	
		aërob bei 37° C.	
		Kontrolle (nicht erhitzt)	erhitzt
Gewöhnliches Agar	Platte a	7 460 750	0
	» b	—	0
Darmschleimhaut-Agar	Platte a	—	0
	» b	—	0
Reis-Agar	Platte a	—	0
	» b	—	0

Versuch 43. (Kotprobe, 10 Minuten auf 99,5° C. erhitzt.)

Nährböden		Anzahl der Kolonien pro ca. 1 mg	
		aërob bei 37° C.	
		Kontrolle (nicht erhitzt)	erhitzt
Gewöhnliches Agar	Platte a	245 025	11
	» b	—	7
Angef. Fleisch-Agar (bei 20° C. 9 Tage gefault)	Platte a	—	1
	» b	—	0
	» c	—	0
Angef. Reis-Agar (bei 37° C. 7 Tage lang gefault)	Platte a	—	4
	» b	—	12
	» c	—	5
Angef. Erbsen-Agar (bei 37° C. 7 Tage gefault)	Platte a	—	10
	» b	—	10
	» c	—	9

Versuch 44. (Kotprobe, 30 Minuten auf 99,5° C. erhitzt.)

Nährböden		Anzahl der Kolonien pro ca. 1 mg	
		aërob bei 37° C.	
		Kontrolle (nicht erhitzt)	erhitzt
Gewöhnliches Agar	Platte a	379 325	0
	» b	—	0
Angef. Fleisch-Agar (bei 20° C. 9 Tage gefault)	Platte a	—	1
	» b	—	0
Angef. Reis-Agar (bei 37° C. 7 Tage gefault)	Platte a	—	1
	» b	—	0
Angef. Erbsen-Agar (bei 37° C. 7 Tage lang gefault)	Platte a	—	4
	» b	—	4
	» c	—	3

Es schien nicht ohne Interesse zu sein, auch das quantitative Verhalten der Bakterien in aufbewahrten Kotproben zu verfolgen. Zu diesem Zwecke wurde je eine Probe des frisch entleerten Kotes in sterile Doppelschalen gebracht, und ein Schalenpaar in Zimmertemperatur, das andere in Bruttemperatur bei 36° C. (ohne besonderen Schutz gegen Eintrocknen) aufbewahrt. Wie die Tabellen zeigen, findet in dem aufbewahrten Kot zunächst eine erhebliche Abnahme der Bakterienzahl statt und zwar schneller bei 37° C. als bei 20° C. Nachträglich tritt dann aber eventuell wieder eine erhebliche Zunahme ein, an der aber nur einzelne Bakterienarten sich beteiligen. Diese Zunahme tritt weniger hervor bei dem im Brutofen aufbewahrten und infolgedessen stärker eintrocknenden Kot.

Versuch 45.

Datum	Nährböden	Anzahl d. bei 37° C. gewachsenen Kolonien pro ca. 1 mg		
		bei 20° C. auf- bewahrte Kotprobe	bei 37° C. auf- bewahrte Kotprobe	
18. VII. (Frisch entleerter Kot)	Gewöhnliches Agar	{ Platte a	599 760	{ 317 520 keine Platte gegossen
		{ » b	388 080	
		{ » c	282 240	
	Glycerin-Agar	{ Platte a	599 760	{ 246 960 176 400
		{ » b	529 200	
20. VII.	Glycerin-Agar	{ Platte a	72 765	{ 19 845 19 845 19 845
		{ » b	48 510	
		{ » c	24 255	
21. VII.	Glycerin-Agar	{ Platte a	24 255	{ 0 0 0
		{ » b	72 765	
		{ » c	97 020	
22. VII.	Glycerin-Agar	{ Platte a	308 700	{ 0 0
		{ » b	330 750	
23. VII.	Glycerin-Agar	{ Platte a	24 239 250	{ 13 950 37 170
		{ » b	25 697 250	
24. VII.	Gewöhnliches Agar	{ Platte a	30 375 000	{ 122 170 134 520
		{ » b	34 263 000	
27. VII.	Glycerin-Agar	{ Platte a	102 847 500	{ 83 160 71 820
		{ » b	102 847 500	
1. VIII.	Glycerin-Agar		13 608 000	15 950

Versuch 46.

Datum	Nährböden		Anzahl d. bei 37° C. gewachsenen Kolonien pro ca. 1 mg	
			bei 20° C. aufbewahrte Kotprobe	bei 37° C. aufbewahrte Kotprobe
22. VII. (Frisch entleerter Kot)	Glycerin-Agar	{ Platte a	198 450	198 450
		{ » b	keine Platte gegoss.	178 605
23. VII.	Glycerin-Agar	{ Platte a	404 999	139 645
		{ » b	372 063	131 796
24. VII.	Gewöhnliches Agar	{ Platte a	297 675	113 400
		{ » b	202 020	106 890
27. VII.	Glycerin-Agar	{ Platte a	65 100	2 100
		{ » b	60 900	2 100
		{ » c	keine Platte gegoss.	2 100
1. VIII.	Glycerin-Agar	{ Platte a	1 640 250	{ keine Platte gegossen
		{ » b	1 752 600	
3. VIII.	Glycerin-Agar	{ Platte a	15 695 000	{ keine Platte gegossen
		{ » b	19 642 500	

Versuch 47.

Datum	Nährböden		Anzahl d. bei 37° C. gewachsenen Kolonien pro ca. 1 mg	
			bei 20° C. aufbewahrte Kotprobe	bei 37° C. aufbewahrte Kotprobe
26. VII. (Frisch entleerter Kot)	Gewöhnliches Agar	{ Platte a	186 340	48 400
		{ » b	146 410	12 100
		{ » c	106 480	{ keine Platte gegossen
		{ » d	93 170	
27. VII.	Glycerin-Agar	{ Platte a	12 100	0
		{ » b	12 100	0
1. VIII.	Gewöhnliches Agar	{ Platte a	15 035 625	0
		{ » b	15 593 875	0

Versuch 48.

Datum	Nährböden		Anzahl d. bei 37° C. gewachsenen Kolonien pro ca. 1 mg	
			bei 20° C. aufbewahrte Kotprobe	bei 37° C. aufbewahrte Kotprobe
31. VIII. (Frisch entleerter Kot)	Gewöhnliches Agar		58 630	52 920
	Leber-Agar	{ Platte a	79 950	43 470
		{ » b	42 640	keine Platte gegoss.

Fortsetzung zu Versuch 48.

Datum	Nährböden	Anzahl d. bei 37° C. gewachsenen Kolonien pro ca. 1 mg	
		bei 20° C. auf- bewahrte Kotprobe	bei 37° C. auf- bewahrte Kotprobe
	Gewöhnliches Agar	31 500	keine Platte gegossen
1. IX.	Leber-Agar {	Platte a	31 500
		„ b	33 600
2. IX.	Gewöhnliches Agar	45 360	0
3. IX.	Leber-Agar {	Platte a	67 200
		„ b	Platte verunglückt
4. IX.	Leber-Agar {	Platte a	55 660
		„ b	54 150
5. IX.	Gewöhnliches Agar {	Platte a	16 445
		„ b	15 180
6. IX.	Gewöhnliches Agar {	Platte a	185 460
		„ b	183 420
7. IX.	Glycerin-Agar {	Platte a	1 002 540
		„ b	1 457 280
8. IX.	Gewöhnliches Agar {	Platte a	5 762 020
		„ b	6 146 855
9. IX.	Glycerin-Agar {	Platte a	17 538 758
		„ b	46 395 485

III. Die im menschlichen Kot gefundenen Arten von Mikroorganismen.

Escherich¹⁾ hat gefunden, daß, sobald kleinen Kindern die Milchnahrung entzogen und andere Kost verabreicht wurde, sich die Arten der Darmbakterien erheblich änderten: manche Arten verschwanden ganz und neue traten auf. Im Milch- und Mekoniumkote fand er 19 verschiedene Mikroorganismen.

Macfadyen, Nencki und Sieber²⁾ fanden im Dünn- und Dickdarm nach Erbsen- und Fleischkost sieben Arten von Mikroorganismen. Nothnagel³⁾ beschrieb als Bakterien des Darmes 25 Arten von Mikroorganismen.

1) Escherich, Die Darmbakterien des Säuglings etc., 1886.

2) Macfadyen, Nencki und Sieber, Archiv f. experimentelle Pathologie u. Pharmakologie, Bd. 28, S. 328.

3) Nothnagel, s. seine Pathologie und Therapie.

Bei der Untersuchung von 48 Kotproben (mittels 1319 Platten-Kulturen) sind von mir folgende 44 Arten von Mikroorganismen gefunden und durch Untersuchung in Reinkultur identifiziert worden. Selbstverständlich kann ich nicht mit Sicherheit ausschließen, daß gelegentlich ein Luftkeim mir als aus dem Kot stammend imponiert hat, obwohl ich nach Möglichkeit derartige Luftverunreinigungen meiner Kulturen zu vermeiden gesucht habe.

1. Bakterium coli commune (regelmäßig); 2. ein Milch nicht coagulierender Colonbacillus (in 1 Probe); 3. ein dem Bacillus coli ähnlicher, aber nicht pathogener, weder Gas noch Indol bildender Bacillus (in 1 Probe); 4. Bacillus subtilis (häufig); 5. Bacillus mesentericus vulgatus (fast regelmäßig); 6. Bacillus mesentericus fuscus (in 3 Proben); 7. Bacillus mesentericus ruber (in 5 Proben); 8. Bacillus mycoides (in 1 Probe); 9. Bacillus mycoides roseus? (in 4 Proben); 10. Bacillus aërophilus (in 21 Proben); 11. Bacillus implexus (in 3 Proben); 12. Bacillus ruber berolinensis¹⁾ (in 1 Probe); 13. Bakterium latericium (in 1 Probe); 14. Bakterium helvolum (in 4 Proben); 15. Bacillus bruneus Adametz und Wichmann²⁾ (in 1 Probe); 16. Bakterium bruneum Schröder³⁾ (in 2 Proben); 17. Bacillus proteus vulgaris (in 2 Proben); 18. Bacillus proteus Zopfii (in 1 Probe); 19. Bakterium limbatum acidi lactici (in 1 Probe); 20. Bacillus aquatilis sulcatus IV. (in 23 Proben); 21. Bacillus fluorescens liquefaciens (in 8 Proben); 22. Bacillus fluorescens non liquefaciens (in 6 Proben); 23. Bacillus devorans Zimmermann⁴⁾ (in 1 Probe); 24. Bacillus lacteus (in 1 Probe); 25. Bacillus tenuis citreus (in 1 Probe); 26. Mikrokokkus roseus (in 1 Probe); 27. Mikrokokkus luteus (in 32 Proben); 28. Mikrokokkus auran-

1) Bac. ruber berolinensis, s. Fränkels Grundr. d. Bakterienkunde, IV. Aufl., S. 252.

2) Bac. brunneus, s. Eisenbergs Bakteriolog. Diagnostik, 1891, Nr. 115.

3) Bakterium bruneum Schröder ist nach Lehmann der Gramschen Färbung zugänglich, während es sich bei unseren Untersuchungen immer entfärbte.

4) Bacillus devorans hat nach Zimmermann sehr lebhafte Eigenbewegung, während dieselbe meinem Bacillus fehlte. Er wuchs in Milch, ohne sie zu coagulieren, und in Traubenzucker-Bouillon ohne Gasbildung.

tiacus (in 25 Proben); 29. Mikrokokkus rosettaceus (in 1 Probe); 30. Mikrokokkus flavus liquefaciens (in 1 Probe); 31. Mikrokokkus concentricus (in 1 Probe); 32. Mikrokokkus coronatus (in 2 Proben); 33. Staphylokokkus pyogenes albus? (in 9 Proben); 34. Staphylokokkus pyogenes citreus? (in 5 Proben); 35. Staphylokokkus pyogenes aureus? (in 19 Proben); 36. Streptokokkus pyogenes Rosenbach? (in 13 Proben); 37. Sarcina aurantiaca Lindner (in 5 Proben); 38. Sarcina lutea (in 6 Proben); 39. Weiße Hefe (in 2 Proben); 40. Rosa Hefe (in 2 Proben); 41. Pathogene Kapselhefe (in 1 Probe); 42. Oidium lactis (in 4 Proben); 43. Penicillium glaucum (in 13 Proben); 44. Mucor mucedo (in 2 Proben).

Der dem Streptokokkus pyogenes durchaus ähnliche Kokkus Nr. 36 und der Bacillus aquatilis sulcatus IV Nr. 20 entwickelten in den aufbewahrten Kotproben nach 5—7 Tagen als letzte Bakterien, während die meisten anderen Bakterien schon zu Grunde gegangen waren. (Vergl. Versuch 45—48.)

Es würde zu weit führen, sämtliche bei der Untersuchung der im Kote gefundenen Bakterienarten von mir gemachten Befunde hier mitzuteilen; ich werde mich vielmehr auf die Besprechung der bezüglich einzelner Arten gemachten Beobachtungen beschränken.

Bakterium coli commune.

1. Morphologie. Das Bact. coli com. hat bekanntlich keine Neigung zur Bildung von langen Fäden, während das Gegenteil beim Typhusbacillus der Fall ist. Ich habe in 8 bis 14 Tagen alter neutralisierter oder nicht neutralisierter Peptonbouillon sehr lange Fäden beim Bact. coli com. gesehen, welche meist aus 4 bis 10, zuweilen aus mehr als 30 Gliedern bestanden. In 10proz. Gelatine wurde dagegen niemals Fadenbildung von mir beobachtet. Ich fand in 8 und mehr Tage alten Bouillonkulturen ziemlich oft an echte Verzweigungen erinnernde Formen mit ziemlich lebhafter Eigenbewegung.

2. Eigenbewegung. Die von mir untersuchten Coli-Stämme hatten in der Regel in 16 bis 24 Stunden alten Kulturen sehr lebhafte Eigenbewegungen wie Typhusbacillen, bei längerer Aufbewahrung der Kulturen aber nahm die Beweglichkeit mehr und mehr ab, bis sie schließlich ganz aufhörte. Die langen Fäden zeigen auch oft schwache Eigenbewegungen.

Ich habe über 200 auf Kotplatten gewachsene Kolonien von *Bact. coli* com. untersucht, die Bacillen aber nur ausnahmsweise ganz unbeweglich gefunden; nachdem diese scheinbar der Eigenbewegung entbehrenden Stämme frei- bis siebenmal auf andere neue Nährböden übertragen waren, haben auch sie lebhaftige Eigenbewegung gezeigt.

Je nach der Art des Nährbodens und der Temperatur ist die Beweglichkeit verschieden. In Bouillonkultur erhält sich die Eigenbewegung in der Regel viel länger (meist 20 Tage lang) als auf Agar und Gelatine. Bei 35 bis 38° C hörte die Eigenbewegung schon nach 2 bis 4 Tagen, bei 39 bis 41° C nach 24 bis 48 Stunden auf, während sie bei Zimmertemperatur unter sonst gleichen Verhältnissen noch nach 15 bis 20 Tagen nachweisbar war.

Terni¹⁾ fand, daß die Eigenbewegung des *Bact. coli* com. in schwach sauren Nährflüssigkeiten (z. B. in nicht neutralisierter Fleischbrühe) ganz fehlt; ich habe aber auch in saurer Fleischbrühe und in nicht neutralisierter Peptonbouillon ohne oder mit dem Zusatz von geringen Mengen der Salzsäure, Schwefelsäure, Salpetersäure oder Essigsäure nach 14 bis 20 Tagen, ja ausnahmsweise noch nach 42 Tagen, lebhaftige Eigenbewegung beobachtet.

3. Häutchenbildung auf der Oberfläche der Bouillon. Bei Brüttemperatur bildet *Bact. coli* com. weit schneller Häutchen als bei Zimmertemperatur, bei welcher dieselben erst nach 8 bis 14 Tagen entstehen.

4. Einfluß des Nährbodens. *Bact. coli* com. entwickelt sich am besten auf Leber-Agar, auf welchem die Kolonien bald einen Durchmesser von 8 mm erreichen, während unter sonst gleichen Umständen auf gewöhnlichem Nähr-Agar und Pankreas-Agar nur 7 mm, auf Hirn-Agar 5 mm, auf Darmschleimhaut-Agar und Fäces-Agar 3 bis 4 mm Durchmesser zeigen.

5. Milchgerinnung. Milch wird durch das *Bact. coli* com. bei 40° C. nach 4 bis 8 Tagen, bei 37° C. nach 18 bis 48 Stunden unter starker Säurebildung zur Gerinnung gebracht. Ich habe aber auch einen die Milch nicht coagulierenden, in allen anderen Eigenschaften aber mit dem *Bact. coli* com. übereinstimmenden *Bacillus* gefunden.

6. Indolbildung. Wie Lembke²⁾ beobachtet hat, ist die Indolbildung durch *Bact. coli* com. keine konstante und gleichmäßige. Die von mir gefundenen Resultate sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.

Nährböden	Alter der bei 20° C. gehaltenen Kulturen	Anzahl d. Untersuchungen	Indolreaktion
Neutralisierte Peptonbouillon	1 Tag	41	{ 12 mal negativ 7 mal unsicher 6 mal angedeutet 16 mal schwach

1) Terni, s. Parasitologie von Weichselbaum, 1898, S. 173.

2) Lembke, Beitrag zur Bakterienflora des Darmes. Archiv f. Hygiene, Bd. 26, S. 293.

Nährböden	Alter der bei 20° C. gehaltenen Kulturen	Anzahl d. Untersuchung.	Indolreaktion
Neutralisierte Peptonbouillon	2 Tage	20	1 mal negativ
			4 mal unsicher
			1 mal angedeutet
	4 Tage	25	10 mal schwach
			4 mal deutlich
			7 mal angedeutet
Nicht neutralisiertes Fleischwasser	42 Tage	13	11 mal schwach
			4 mal deutlich
			4 mal stark
Peptonbouillon mit wenig verschiedener Säure (Reaktion: deutlich sauer)	42 Tage	7	1 mal negativ
			3 mal deutlich
			9 mal stark
	42 Tage	30	7 mal negativ
			2 mal negativ
			2 mal angedeutet
			3 mal schwach
			10 mal deutlich
			13 mal stark

7. Gasbildung. Dieselbe war der Quantität nach ebenfalls in den einzelnen Versuchen sehr verschieden. In 1 proz. Traubenzuckerbouillon war sie unter 35 Fällen in 20 Fällen eine starke, in 12 Fällen eine mittelstark und in 3 Fällen nur eine überaus geringe.

In reinem Peptonwasser und reinem Kartoffeldekot habe ich keine Gasbildung beobachtet. In Zwiebeldekot ohne Zuckerzusatz fand ich üppige Gasbildung wie in Traubenzuckerbouillon.

Bacillus fluorescens liquefaciens und Bacillus pyocyaneus.

Auf den gebräuchlichen Nährböden vermag ich diese beiden Bakterienarten nicht zu unterscheiden. Nach Lehmann¹⁾ bestehen Unterschiede bei der Gramschen Färbung und in Milchkultur; ich kann ihm hierin aber nicht beistimmen, wie ich bereits im Archiv für Hygiene, Band 36, angegeben habe. Meine neueren Untersuchungen haben mich in meiner Ansicht nur bestärkt.

Bacillus pyocyaneus bildet manchmal dunklere Farbstoffe als Bacillus fluorescens liquefaciens. Auf Reisbrei, Reis-Agar, Reis-Gelatine und Erbsen-Agar produziert Bacillus pyocyaneus üppig Pigment, während Bacillus fluorescens liquefaciens, sowie Bacillus fluorescens non liquefaciens und Bacillus pyocyaneus nur Spuren oder gar keinen Farbstoff bilden. Überträgt man den Bacillus fluorescens liquefaciens etc. von Reismährböden zurück auf die gebräuchlichen Nährböden, so stellt sich die Pigmentbildung wieder ein.

1) Lehmann, s. sein Grundrifs der Bakteriologie.

Auf manchen Nährböden bildet auch der *Bacillus pyocyaneus* trotz guten Wachstums keinen oder nur sehr spärlichen Farbstoff, so auf Harn-, angefaultem Milch- und angefaultem Pankreas-Agar, sowie in Harn. Wenn man ihn aber auf gewöhnliche Nährböden zurückbringt, dann bildet sich auch hier wieder das Pigment reichlich.

***Bacillus mycoides roseus*?**

Mikroskopisches Aussehen: Ziemlich große Stäbchen mit abgerundeten Enden, oft zu langen Stäbchenkettten verbunden.

Sporen: Bildet ovale Sporen in der Mitte des Stäbchens.

Eigenbewegung: Sehr lebhaft bei den kurzen Formen.

Färbbarkeit: Nach Gram färbbar.

Ansprüche an Nährböden und Temperatur: Gedeiht auf den verschiedensten Nährböden bei Zimmertemperatur. Das Wachstum erfolgt sehr rasch. Bei 37° C. wächst er viel schneller als bei Zimmertemperatur.

Gelatineplatte, Gelatinestich, Agarplatte, Agarstich, Agarstich und Bouillonkultur: Wie bei dem *Bacillus anthracis*. Auf Agarstichkultur tritt Bildung von rotem Farbstoff ganz selten ein.

Milch: Bei 37° C. nach 4 bis 6 Tagen peptonisiert. Nach 1½ Monaten tritt eisenrostartige Verfärbung ein.

Kartoffelkultur: Schmutzigweißer bis grauweißer Belag mit wellig ausgebuchtetem Rand, etwas erhaben, bei 37° C. trocken, matt, niemals glänzend, bei 20° C. saftigglänzend (was aber später verschwindet), ziemlich ausgebreitet; der Belag verfärbt sich bald rosa, bei längerem Stehen sieht er wie mit Mehl bestäubt aus.

In Bouillon wird in 3—4 Tagen kein Indol, in Zuckerbouillon kein Gas gebildet.

Pathogenität: Für Mäuse und Meerschweinchen nicht pathogen.

Nach Scholl¹⁾ bildet *Bacillus mycoides roseus* auf Agar und Gelatine-nährböden roten Farbstoff und ist unbeweglich, während mein *Bacillus* lebhaftige Eigenbewegung hat und nur auf Kartoffeln oder ganz selten auf Agar roten Farbstoff bildet.

Er steht zwischen dem *Bacillus mesentericus ruber* und *Bacillus mycoides roseus* Scholl.

***Bacillus lacteus*.**

Mikroskopisches Aussehen: Kurzes Stäbchen mit *Bact. coli commune*, manchmal zu zwei oder vier Gliedern verbunden.

Sporen: Nicht nachweisbar.

Eigenbewegung: Fehlt.

Färbbarkeit: Nach Gram nicht gut oder gar nicht färbbar.

Ansprüche an Temperatur und Nährboden: Gedeiht auf den verschiedensten Nährböden bei 20° und 37° C.

Gelatineplatte: Nach einem Tag weiße kleine Kolonien, die bei schwacher Vergrößerung gelblich, rundlich und grobgekörrnt erscheinen. Verflüssigt die Gelatine allmählich.

1) Scholl, Fortschritte der Medizin, 1889, S. 46.

Gelatinestich: Anfangs ähnlich demjenigen des *Bact. coli commune*. Nach 4 Tagen verfärbt die Auflagerung sich gelblich bis citronengelb. Nach 10 bis 14 Tagen verflüssigt die Gelatine sich langsam tellerförmig mit citronengelbem Bodensatz und hellgelber Decke und klarem Inhalt der Verflüssigungszone.

Agarplatte: Nach 2 Tagen bei Zimmertemperatur weißliche, kleine tropfenartige Kolonien von 0,4 bis 0,8 mm Durchmesser, später milchweisse tropfenartige Kolonien, die bei schwacher Vergrößerung rundlich, gelb bis dunkelgelb erscheinen, in der Mitte ein ziemlich großes Körnchen, nach außen hellgelbe mittelgroße Körnchen und einen hellgelben Rand zeigen. Die tiefliegenden Kolonien erscheinen nur als kleine Pünktchen, bei schwacher Vergrößerung als gelbliche Kolonien mit verschiedenen Formen.

Agarstrich: Nach 2 Tagen milchweisser, bald ziemlich dichter, bald dünner matt glänzender Belag mit unregelmäßigem Rand. Kondenswasser ist klar mit weißem Bodensatz.

Blutserumstrich: Dünner, weißer, nicht glänzender Belag. Blutserum verflüssigt sich nicht. Kondenswasser ist klar mit weißem Bodensatz.

Bouillon: Bei Zimmertemperatur starke Trübung nach einem Tag mit weißlichem Bodensatz.

Milch: Bei 37° C nach 2 Tagen fest coaguliert, auch nach einem Monat nicht verflüssigt. Bei Zimmertemperatur coaguliert die Milch erst nach Ablauf von mehreren Tagen.

Kartoffeln: Milchweisser, etwas saftiger, nicht glänzender, gewöhnlich auf den Strich beschränkter, etwas erhabener Belag.

In Bouillon wird kein Indol, in Zucker-Agar kein Gas gebildet.

Pathogenität: Für Mäuse und Meerschweinchen nicht pathogen.

Bacillus tenuis citreus.

Mikroskopisches Aussehen: Dem Tuberkelbacillus ähnliches, ziemlich langes, feines Stäbchen, meist einzeln, selten zu zweien verbunden.

Sporen: Nicht nachweisbar.

Eigenbewegung: Fehlt.

Färbbarkeit: Nach Gram färbbar.

Ansprüche an Nährboden und Temperatur: Wächst auf den verschiedensten Nährböden bei 20° C. und 37° C. ziemlich langsam.

Gelatineplatte: Nach 3 Tagen gelbliche weiße Pünktchen; nach 5 bis 6 Tagen verflüssigt die Gelatine sich etwas; die rundlichen Kolonien werden höchstens 1,5 mm im Durchmesser groß.

Bei schwacher Vergrößerung erscheinen die Kolonien nach 3 Tagen rundlich, gelb mit großen Körnchen und zackigem Rand. Nach 5 bis 6 Tagen rund, goldgelb und zeigen in der Mitte ein goldgelbliches maulbeerförmiges großes Körnchen. Die übrigen Körnchen werden nach dem Rand zu kleiner.

Gelatinestich: Anfangs gelblichweiß, fadenartig. Die Auflagerung ist citronengelb, saftig glänzend. Nach 3 bis 4 Tagen verflüssigt die Gelatine sich allmählich tellerförmig mit gelbem Bodensatz und hellgelber Decke. Inhalt der Verflüssigungszone ist feinkörnig getrübt.

Agarplatte: Bei Zimmertemperatur nach 2 Tagen dünne, runde, graulichweiße Kolonien von 1 mm Durchmesser; bei schwacher Vergrößerung goldgelbe, runde, eiförmige oder linsenförmige Kolonien mit scharfem Rande.

Agarstrich: Nach 1 Tage bei Zimmertemperatur dünne, kleine, grauweiße Tröpfchen, nach 7 Tagen dünner, gelblichweißer, saftigglänzender, auf die Impfstelle beschränkt bleibender Belag. Das Kondenswasser ist klar mit gelbem Bodensatz.

Blutserumstrich: Nach 4 Tagen schwefelig citronengelber, saftiger, glänzender Belag. Das Blutserum verflüssigt sich nicht. Das Kondenswasser ist klar mit gelblichem Bodensatz.

Milch: Ziemlich langsam coaguliert, nach 2 Monaten noch fest. Saure Reaktion.

Bouillon: Nach 2 Tagen schwach getrübt mit gelblichweißem Bodensatz, ohne Häutchen. In Gärungskölbchen trübt sich nur der offene Schenkel, der geschlossene Schenkel bleibt klar.

Kartoffel: Nach 1 bis 2 Tagen üppige grünlichgelbe, saftige, etwas dünne Auflagerung. Nach 10 bis 15 Tagen verfärbt die Kartoffel sich bräunlich.

In Bouillon wird kein Indol, in Traubenzucker-Agar kein Gas gebildet.

Pathogenität: Für Meerschweinchen und Mäuse nicht pathogen.

Ein dem Bakterium coli commune ähnlicher Bacillus.

Mikroskopisches Aussehen: Einzelne kurze Stäbchen mit abgerundeten Enden (wie *Bact. coli com.*). Im Kondenswasser und in Bouillon bilden sie lange Ketten, aus Kugeln oder ovalen Bacillen bestehend, ähnlich dem *Pestbacillus*.

Eigenbewegung und Färbbarkeit: Keine Eigenbewegung, nach Gram nicht färbbar.

Ansprüche an Temperatur und Nährboden: Wächst rasch und üppig bei 20° und 37° C. auf allen Nährböden, jedoch bei Zimmertemperatur etwas besser als bei 37° C.

Gelatineplatte, Gelatinestich, Agarstrich und Bouillonkultur: Wie *Bact. coli com.*

Milch: Nicht coaguliert, Reaktion mäßig sauer.

Kartoffel: Anfangs undeutlich, später dünne, graulichweiße, saftige Auflagerung.

Bildet in Bouillon weder Indol noch H_2S , in Traubenzuckerbouillon kein Gas.

Pathogenität: Für Meerschweinchen nicht pathogen.

Pathogene Kapselhefe.

Mikroskopisches Aussehen: Ziemlich große elliptische Zellen von sehr wechselnder Dimension. Während die jüngeren kleineren Formen sich intensiv färben und scharfe Konturen zeigen, finden sich auch größere, im Degenerationszustand befindliche Exemplare, welche die Färbung nur schlecht annehmen und einen großen hellen, ungefärbten Hof erkennen lassen.

Eigenbewegung: Fehlt stets.

Färbbarkeit: Mit Anilinfarbstoff und nach Gram.

Ansprüche an Temperatur und Nährboden: Wächst ziemlich langsam, am besten bei Zimmertemperatur auf Agar und Kartoffeln.

Gelatineplatte: Nach 5 Tagen 0,5 mm große, weisse, tropfenförmige, saftig glänzende Kolonien. Bei schwacher Vergrößerung erscheinen sie rund und scharfkantig mit gelblichen großen Körnchen, später schwärzlich.

Gelatinestich: Nach 2 Tagen auf der Oberfläche und im Stichkanal weifsliche, sehr kleine Kolonien; nach 10 Tagen tritt im Stichkanal Verflüssigung mit schneller Verdunstung der verflüssigten Gelatine ein. Trichterinhalt getrübt mit graulichweissem Bodensatz.

Agarplatte: Nach 4 Tagen bei 20° C. 1 bis 2,5 mm große, weisse, runde, dicke, saftige, tropfenförmige Kolonien. Bei schwacher Vergrößerung erscheinen sie glattrandig, in der Mitte schwärzlich mit feiner Strichelung, peripher durchscheinend. Im Centrum der Kolonien ist ein ganz schwarzer undurchsichtiger Klumpen. Die tiefliegenden Kolonien sind rundlich, eiförmig, spindelförmig, herzförmig, speerförmig, glattrandig und undurchsichtig.

Agarstrich: Anfangs unsichtbar, nach 3 Tagen (bei Zimmertemperatur) bemerkt man erst kleine graulichweisse Kolonien, später sehr dicken graulichweissen, saftig glänzenden Belag mit glattem Rand. Das Kondenswasser klar mit weislichem Bodensatz.

Bouillon: Trübt sich erst nach 7 Tagen (bei 20° C.) schwach, dann in den oberen Schichten stärker mit weislichem Bodensatz; keine Häutchenbildung.

Traubenzuckerbouillon im Gärungskolben: Der geschlossene Schenkel bleibt immer klar, während der offene Schenkel stark getrübt ist. Keine Gasbildung.

Milch: Nicht coaguliert; Reaktion schwach sauer.

Kartoffel: Nach 3 Tagen (bei 20° C.) kleine weifsliche, etwas dicke, trockene, glanzlose Auflagerung, welche allmählich in Form von Klümpchen sich verdickt. Nach 10 Tagen verfärbt sich die Kartoffel bräunlich; nach 15 Tagen sehr dicke, schmutziggraue, maulbeerförmige Auflagerung, die später geradezu schwarz wird. Sät man von dieser Kultur wieder aus, so entstehen wieder weisse Kolonien.

In Bouillon wird kein Indol, in Traubenzucker-Agar kein Gas gebildet. Pathogenität:

Meerschweinchen I (380 g Körpergewicht) erhielt 0,4 ccm einer 16 Tage alten Bouillonkultur subcutan. 3 Tage nach Infektion stirbt das Tier.

Sektion: Alle Organe makroskopisch unverändert; in allen Organen aber die Hefe nachweisbar.

Meerschweinchen II (580 g Körpergewicht) erhielt subcutan 0,3 ccm einer Aufschwemmung von einer Öse Agarkultur (ca. 25 Tage alt bei Zimmertemperatur) in 10 ccm sterilisiertem Wasser. 11 Tage nach der Infektion stirbt das Tier.

Sektion: Leber dunkel, bläulichbraun, etwas vergrößert; sonst Organe anscheinend normal. Im Blut und allen Organen die Hefen nachweisbar.

Eine weiße Maus erhielt 0,1 ccm einer ca. 10 Tage alten Bouillonkultur subcutan. 20 Tage nach der Infektion ziemlich schwer krank, aber mit der Zeit wieder gesundend.

Die Hauptergebnisse meiner Untersuchungen können folgendermaßen zusammengefaßt werden:

1. Als günstigster fester Nährboden für die Bakterien der Fäces hat sich im allgemeinen ein mit Leberabkochung bereitetes Nähragar erwiesen.
2. Bei Züchtung unter Wasserstoff wachsen in der Regel erheblich mehr Bakterienkolonien aus den Fäces als bei Züchtung unter Luftzutritt.
3. Züchtung bei Brüttemperatur läßt in der Regel erheblich mehr Bakterienkolonien zur Entwicklung kommen als Züchtung bei Zimmertemperatur.
4. Neutrale oder schwach saure Reaktion des Nährbodens scheint dem Wachstum der Fäcesbakterien im allgemeinen günstiger zu sein als alkalische Reaktion.
5. Die Zahl der entwicklungsfähigen Mikroorganismen ist in verschiedenen Kotproben außerordentlich verschieden.
6. Die höchste Zahl der unter den günstigsten Bedingungen aus 1 mg Fäces gewachsenen Bakterienkolonien (ca. 18 Millionen) bleibt noch weit zurück hinter der Zahl der aus 1 mg einer Oberflächenkultur vom Bakterium coli commune gewachsenen Kolonien (ca. 700—1000 Millionen).
7. Die in den Fäces vorhandenen Bakterienarten kommen offenbar durchaus nicht alle in unseren Kulturen zur Entwicklung. Immerhin habe ich aus 48 Kotproben 44 Arten von Mikroorganismen isolieren können.
8. Widerstandsfähige Dauerformen von Mikroorganismen sind in den Fäces nur in verhältnismäßig sehr geringer Zahl vorhanden.
9. In aufbewahrten Kotproben findet im allgemeinen zunächst eine Abnahme der entwicklungsfähigen Bakterien, dann aber wieder eine auf wenige Arten beschränkte Zunahme statt.

Lebenslauf.

Ich, Teïsi Matzuschita, wurde zu Kagoshima in Nippon am 9. Juni 1875 als zweiter Sohn des praktischen Arztes Bunïchi Matzuschita und Frau Masako Matzuschita (geb. Hoshiguchi) geboren.

Von 1886 besuchte ich das Gymnasium zu Kagoshima, das ich im Jahre 1891 mit dem Zeugnis der Reife verließ. Alsdann absolvierte ich im Jahre 1895 die medizinische Abteilung der Kaiserl. V. Hochschule zu Nagasaki und erhielt gleich die Approbation als Arzt.

Seit 1898 bin ich zum Zwecke weiterer bakteriologischer Studien nach Deutschland beurlaubt. Als Student in Deutschland gehörte ich der Universität Freiburg Mai 1898—1899, Gießen 1899—1900, Halle 1900 bis zur Vollendung meiner Studien an, und bestand am 2. Dezember 1901 das Examen rigorosum.

Während meiner Studienzeit hörte ich die Vorlesungen folgender Herren Professoren:

In Nagasaki: Higashi, Kubo, Kurimoto, Morinaga, Murayama, Murakami, Otani, Oyama, Takabatake, Takaya, Takayama, Tashiro, Yasuo, Yoshida.

In Freiburg: Bäumlcr, Kahlden, Killian, Oltmanns, Schottelius.

In Gießen: Bostroem, Gaffky, Hansen, Spengel, Wien.

In Halle: Haym, Klebs, Vaihinger.

Allen diesen meinen verehrten Lehrern sage ich aufrichtigen Dank.
